

loge familiale. Le nid se balance aux mouvements que font les petits pour obtenir leur nourriture. Ces oisillons sont très peu farouches et leurs hôtes peuvent facilement les caresser.

**Katzensteuer.** Im katzenreichen St. Gallen will man eine Katzensteuer einführen. „*Luzerner Tagblatt*“ v. 27. IX. 1913.

**Oiseaux électrocutés.** Nos journaux, au commencement d'août, ont relaté le fait qu'un gros rapace nocturne avait provoqué une interruption de courant sur la ligne Hagneck-Val de Ruz. Voici ce qui s'était passé, d'après les renseignements fournis par M. F. Burri de l'Usine électrique de Cernier: Le 28 juillet 1913, vers 8 h. 50 du soir, par un temps calme, ciel clair, une chouette (probablement une chouette chât-huant, et non pas un grand-duc comme cela avait été annoncé. Réd.) provoqua un court circuit aux Prés Royer, au-dessous de Saint-Martin. L'oiseau était complètement carbonisé.

Le 14 août, à midi, une corneille noire s'est fait prendre dans les cornes du parafoudre du transformateur, placé vers la fabrique Perrenoud à Cernier — elle fut tuée et brûlée partiellement.

**Sonderbare Niststellen.** In der „Diana“ wird erzählt, dass in Kestenholz (Kt. Solothurn) in der einen Tasche eines als Vogelscheuche verwendeten Kittels ein *Meisennest*, in der andern das Nest eines *Gartenrotschwanzes* gefunden wurden. Von einem ähnlichen Fall haben wir auch im „*Ornithol. Beob.*“ 1908, S. 61 berichtet. Es handelte sich damals um ein *Starennest* in einem „Strolmann“ auf einem Kirschbaum bei Bischofszell.

Karl Daut.

**Influence du climat sur la taille des oiseaux.** Un naturaliste allemand, M. *Boetticher*, a observé des variations de la taille d'oiseaux de même espèce sous des climats différents. Le corbeau (*Corvus corax*) est plus grand en Norvège et au Groenland que dans l'Europe centrale; celui de l'Himalaya atteint le maximum de grandeur. Par contre celui d'Espagne est plus petit que le nôtre. La corneille est plus grosse en Sibérie, au Kamtchatka et en Mongolie, que dans l'Europe occidentale. La pie est plus petite que chez nous en Algérie, en Tunisie, au Maroc; tandis qu'au Tibet et dans l'Amérique du Nord, elle est de taille supérieure. La mésange bleue des îles Canaries, la mésange charbonnière de Sardaigne et de Corse, sont plus petites que les nôtres. Le roitelet grossit à mesure que l'on remonte vers le Nord. Les oiseaux sont, en général, plus grands dans les régions froides. Il y a pourtant quelques exceptions; le moineau franc est plus grand en Italie, en Syrie, qu'en Suisse.

**Orage néfaste.** L'orage, qui a sévi le vendredi 30 août 1913, dans l'après-midi, particulièrement dans les régions du Val de Travers, de la Sagne, des Ponts et du Vignoble, a été la cause de la perte d'un grand nombre d'oiseaux, tués par les grêlons. L'on en a retrouvé un peu partout dans les champs et dans les vignes.

**Observation sur l'Engoulement.** Un châtelain du comté de Brecon (Pays de Galles) a observé cet été les habitudes de l'Engoulement: ce qui l'a frappé surtout, c'est la façon de boire de cet oiseau. Il effleure la surface des ffots et recueille l'eau dans son bec, sans cesser de voler, un peu à la manière des Hirondelles. C'est la première fois, croyons nous, que l'on a observé cette pratique de l'Engoulement aussi nous empressons-nous de la signaler à nos lecteurs.