



Interessant ist, dass an der gleichen Halde auf der Nordseite des Ankenberges *Sperber*, *Lerchenfalken* und *Mäusebussard* friedlich neben einander wohnten. Von Jagdaufseher Emil Hunziker in Zofingen erhielt ich nachstehender Bericht über die Beobachtung eines **Uhus** im Martinsgraben bei Zofingen. „25. August 1913. Heute morgens 7½ Uhr habe ich an der Wand zwischen dem Seiler und Neudorf einen grossen *Uhu* getroffen. Er ist ein kolossales Tier. Das erste Mal ist er am Boden, das zweite Mal auf einer Tanne gesessen. Am Boden lag eine junge wilde Taube ausgehöhlt.“ Die Zahl der ausgeflogenen **Wespenbussarde** war grösser als diejenige der Mäusebussarde. Leider wurde ein Horst im Bärenhubel bei Zofingen trotz Aufsicht von Unberechtigten ausgeraubt. Man kam nicht auf den Täter; am Stamme der Buche, auf welcher sich der Horst befand, fand man deutliche Spuren von Klettereisen und das halbe Nest lag am Boden. *Ed. Fischer, Zofingen.*


CHRONIK — CHRONIQUE.


Ankunftstermin schlesischer Zugvögel am Brutort.

Von *K. Radig*, zurzeit in Frantzenstein (Schlesien).

	Durchschnittstermin nach Kollibay	1910	1911	1912	1913
Bachstelze , weisse, 148, <i>Motacilla alba</i> L.	Mitte März	16.III.	—	—	22.III.
Baumpieper , 154, <i>Anthus arboreus</i> Bechst.	Mitte April	—	14.IV.	—	—
Buchfink , 177, <i>Fringilla coelebs</i> L. . .	Anf. März	27.II.	26.II.	25.II.	5.III.
Dorngrasmücke , 123, <i>Sylvia cinerea</i> Lath.	Ende April	—	3.V.	—	—
Feldlerche , 150, <i>Alauda arvensis</i> L. . .	Februar	21.II.	21.II.	24.II.	10.II.
Fitislaubvogel , 105, <i>Phyllopneuste trochilus</i> L.	Zweite Aprilwoche	4.IV.	17.IV.	11.IV.	1.IV.
Grauer Fliegenschnäpper , 84, <i>Muscicapa grisola</i> L.	Anf. Mai	2.V.	26.IV.	25.IV.	3.V.
Gartenammer , 167, <i>Emberiza hortulana</i> L.	Ende April, Anf. Mai	—	—	1.V	—
Gartengrasmücke , 127, <i>Sylvia hortensis auct.</i>	Anf. Mai	—	28.IV.	—	1.V.
Gartenspötter , 108, <i>Hypolais salicaria</i> Bp.	Anf. Mai	—	—	5.V.	—
Gebirgsbachstelze , 149, <i>Motacilla sulfurea</i> Bebst.	Anf. März ¹⁾	—	21.III.	—	—
Girlitz , 181, <i>Serinus hortulanus</i> Koch. .	Zweite Aprilwoche	—	—	1.V.	2.IV.

¹⁾ Nach Naumann.

	Durchschnittstermin nach Kolliba ^y	1910	1911	1912	1913
Hausrotschwanz, 137, <i>Ruticilla tithys</i> L.	Ende März	—	2.IV.	24.III.	26.III.
Stadtschwalbe, 48, <i>Hirundo urbica</i> L.	20.–25. April	24.IV.	—	—	1. V.
Heuschreckenrohrsänger, 114, <i>Locustella naevia</i> Bodd.	Ende April Anfang Mai ¹⁾	—	—	12. V.	11. V.
Kiebitz, 219, <i>Vanellus cristatus</i> L.	Anf. März	—	—	2.III.	5.III.
Kuckuck, 51, <i>Cuculus canorus</i> L.	23.–30. April	—	—	—	1. V.
Mauersegler, 46, <i>Cypselus apus</i> L.	Ende April Anfang Mai	10. V.	30.IV.	28.IV.	1. V.
Nachtigall, 139, <i>Luscinia minor</i> L.	19.–30. April	—	—	—	22.IV.
Goldamsel, 55, <i>Oriolus galbula</i> L.	Anf. Mai	15. V.	13. V.	10. V.	11. V.
Rauchschwalbe, 47, <i>Hirundo rustica</i> L.	Anf. April	—	15.IV.	9.IV.	9.IV.
Singdrossel, 132, <i>Turdus musicus</i> L.	Anf. März	—	23. III.	3. III.	12. III.
Star, 52, <i>Sturnus vulgaris</i> L.	30. Januar bis 28. März	25. I.	26. II	25. II.	20. II.
Weisser Storch, 223, <i>Ciconia alba</i> Behst.	Ende März Anfang April	1. IV.	—	8. IV.	31. III.
Turmfalk, 7, <i>Cerchneis timunculus</i> L.	Mitte April	—	5. IV.	10. IV.	—
Wachtel, 205, <i>Coturnix dactylisonans</i> Mey.	28. April bis 22. Mai	—	—	11. V.	—
Wachtelkönig, 236, <i>Crex pratensis</i> Behst.	Mitte Mai	17. V.	11. V.	17. V.	14. V.
Waldlaubvogel, 104, <i>Phyllopneuste sibiratrix</i> Behst.	Ende April	—	—	25. V.	—
Weidenlaubvogel, 106, <i>Phyllopneuste rufa</i> Lath.	Erste Aprilwoche	—	2. IV.	30. III.	26. III.
Wendehals, 75, <i>Jynx torquilla</i> L.	Ende April	24. IV.	19. IV.	25. IV.	24. IV.
Rotrückiger Würger, 83, <i>Lanius collurio</i> L.	Erste Hälfte des Mai	—	—	13. V.	—

Nucifraga caryocatactes relicta Rchw. — Der Alpen-Tannenhäher als neue Form oder Art.

Reichenow erhebt den in den Schweizeralpen, namentlich im Kanton Graubünden häufigen Tannenhäher zu einer neuen Form oder Art. Sie unterscheidet sich vom dünnschnäbligen nordischen Tannenhäher durch viel dunkleren Ton des Körpergefieders und kleinere weisse Tropfenflecke.

Die Tannenhäher, die A. Schifferli Mitte Oktober 1909 bei Davos über der Waldgrenze antraf, gehörten dieser Form an. Am 24. Oktober erlegte er einen solchen auf einer Arve, wo sich mehrere befanden, welche die Arvenzapfen zusammen suchten, dieselben geschickt öffneten und die Samen herausklaubten.

Ein Exemplar, das am 28. August 1905 bei Küblis (Graubünden) erlegt wurde und in Dauts Sammlung nach Bern kam, dürfte ebenfalls dieser neu aufgestellten Form angehören.

Dr. H. Fischer-Sigwart.

Journal ornithologique, août, septembre 1913.

A. Mathey-Dupraz.

Turdus viscivorus, 131 -- la grive draine.

17, 18, 23 und 24 août. Au matin, de très fortes bandes, dans les prés nouvellement fauchés du sommet du Mont Boudry.

¹⁾ Nach Naumann.

Ruticilla tithys — le rouge-queue.

28 sept. Encore quelques-uns (Ferme-Robert, 981 m.).

Ruticilla phœnicurus, 138 — le rossignol de murailles.

10 au 21 sept. ♀ observée au jardin.

Saxicola œnanthe, 143 — le traquet motteux.

2 août. Ad. et juv. aux Bourquins (Côte aux Fées).

9 août. Quelques individus sur Mont Boudry.

Passer domesticus, 175 — le moineau domestique.

15 août. Je vois les adultes nourrir leurs juv. sur la rue.

25 août. Juv. au nid, Château de Colombier.

Ligurinus chloris, 180 — le verdier.

10 au 14 sept. Jardin, juv. nourris par ad.

Citrinella alpina, 182 — le venturon.

17 août. Vol d'une cinquantaine sur les ruines de la Ferme de la Grand Vy (Creux du Van) et sur un sapin voisin.

24 août. Nombreux, sur le Chalet de l'Abreguaie.

Carduelis elegans, 184 — le chardonneret.

2 sept. Observé plusieurs vols de juv.

Columba palumbus, 194 — le pigeon ramier.

3 et 5 août. Un ♂♀ roucoule (Allées).

21 août. Vol d'une trentaine, Prés d'Areuse.

26 sept. Seule observation du mois, 1 individu isolé aux Allées.

Tetrao urogailus, 198 — le grand-tétras.

10 août. Poule avec juv., pâturage de Jogne (garde Magnin).

12 août. Deux couvées (Mont Boudry).

Tetrao bonasia, 200 — la gélinotte.

17 août. Une couvée près du four à chaux (Lessy).

24 août. 3 individus près de la Ferme-Robert.

Gallinula chloropus, 240 — la poule d'eau ordinaire.

4 sept. Soir 4 h., cri dans les roseaux (Creux des grenouilles).

Totanus ochropus, 256 — le chevalier cul-blanc.

11 août. Grand Verger, volier de 5 individus.

15, 21 août. 1 individu, Basse-Reuse.

21 août. 1 individu au Bied. — 1 individu au Grand Verger.

Sept. Observé 1 ou 2 individus à plusieurs reprises.

Actitis hypoleucos, 258 — le chevalier guignette.

16 au 29 sept. Au Port de Colombier, chaque soir 6 h. j'observe une guignette qui se livre à la chasse des Névroptères (Nemura sp.?).

Podiceps cristatus, 314 — le grèbe huppé.

Août-Sept. Chaque jour quelques individus dans la baie d'Auvernier, devant le Bied et le Grand Verger.

Carbo cormoranus, 323 — le cormoran.

Mi-sept. On me signale, 2 individus qui stationnent depuis quelque temps devant la Broye. L'un d'eux se prend au hameçon d'une ligne dormante.

Larus canus, 338 — le gâland à pieds bleus.

12 et 22 août. Revu un juv. près d'Auvernier, en compagnie de rieuses.

Xema ridibundum, 345 — la mouette rieuse.

Mi-août. Nos mouettes du lac ont augmenté en nombre. Le capuchon est complètement disparu.

29, 30, 31 août. Aucune rieuse dans la rade de Genève, quelques-unes dans le Petit-lac.

5 sept. Soir 6 h. au milieu de rieuses adultes, quelques juv. sifflant encore.

Hydrochelidon nigra, 356 — l'hirondelle de mer épouvantail.

13 sept. Depuis quelques jours on observe des épouvantails devant Monruz (Neuchâtel) et en plein lac.

Octobre.

Cerchneis tinnunculus, 7 — la cresserelle.

18 oct. Une criblotte, près Couvet (Val de Travers).

Buteo vulgaris, 27 — la buse ordinaire.

22 oct. Colombier, un individu, volant direction sud, harcelé par une dizaine de corneilles.

26, 27 oct. Après-midi, une buse (phase brune) passe au-dessus des Allées.

Athene noctua, 36 — la chouette chevêche.

12 et 14 oct. Soir 6 h. 30, cris de 2 individus, vers le Château (Colombier).

21 et 23 oct. Soir 6 h., cris aux Allées.

23 oct. Soir 6 h., cri d'un individu aux Prés d'Areuse.

Hirundo rustica, 47 — l'hirondelle de cheminée.

1^{er} oct. Matin 8 h., arrivée d'une trentaine, qui séjournent jusqu'à 10 h. aux alentours du Collège, puis disparaissent.

4 oct. Aux abords du Château, 3 hirondelles.

Hirundo urbica, 48 — l'hirondelle de fenêtre.

8 oct. Un chélidon est signalé à Travers.

Alcedo ispida, 53 — le martin-pêcheur.

20 oct. Sur un saule, un individu perché (Bas des Allées).

21 oct. 1 individu, Port de Colombier.

23 oct. 1 individu, Port d'Auvernier.

27 oct. 1 individu, bord du lac, Grand Verger (il s'agit très probablement du même sujet).

Sturnus vulgaris, 57 — l'étourneau.

1—10 oct. Chaque jour grands vols dans nos environs,

16—21 oct. Quelques petits vols de 4, 5, 10 ou 20 individus.

22 oct. Individus clairsemés 2 ou 3.

27 oct. Groupe de 25 à 30 (Prés d'Areuse).

31 oct. Vol d'une trentaine (Colombier).

Pica caudata, 65 — la pie.

Une quinzaine dans un champ fraîchement labouré à Landeyeux (Va de Ruz).

Dryocopus martius, 70 — le pic-noir.

10 et 19 oct. Cris: à la Ferme-Robert et près du Châlet de l'Abreguaie (Mont Boudry).

Lanius excubitor, 80 — la pie-grièche grise.

7 oct. Après-midi, un individu sur fil conduite électrique, aux Gouguliettes, près Boudry (même lieu que le 12 octobre 1912 et 1, 24, 25 sept. 1913).

Parus cristatus, 95 — **la mésange huppée.**

12 oct. Un individu dans les buissons de saule (Port de Colombier).

Parus cœruleus, 97 — **la mésange bleue.**

8 oct. Matin, jardin, un individu, première observation (n'en avais vu aucune depuis la fin juin).

Phylloperute rufa, 106 — **le pouillot vélocé.**

23 oct. Un individu isolé, dans les roseaux (Bas des Allées).

Merula vulgaris, 128 — **le merle noir.**

19 oct. Relâché ♂ juv., bec noir (annellé 2036).

Turdus viscivorus, 131 — **la grive draine.**

6 oct. Tôt le matin, vol nombreux aux Allées, peu après le sol est jonché de feuilles de gui (*Viscum album*).

27 oct. Au matin, quelques-unes, même endroit.

30 oct. Après-midi, quelques-unes, même endroit.

Ruticilla tithys, 137 — **le rouge-queue.**

1—13 oct. Cri et chant chaque jour. Dernière observation le 13 (le lendemain bise forte et froide).

Ruticilla phœnicurus, 138 — **le rossignol de murailles.**

11 oct. ♂♀ encore signalé à Travers (Martin).

Dandæus rubecula, 142 — **le rouge-queue.**

Tout le mois, chant.

Motacilla alba, 148 — **la bergeronnette grise.**

Dès mi-octobre. Nombreuses, rives du lac.

Fin-octobre. Très nombreuses, rives du lac.

Motacilla sulfurea, 149 — **la bergeronnette printanière.**

De mi à fin oct. Assez nombreuses, rives du lac et le long de l'Areuse.

Anthus aquaticus, 152 — **le pipi spioncelle.**

20, 23 au 31 oct. Nombreux, rives du lac.

Anthus pratensis, 153 — **le pipi farlouse.**

6 au 31 oct. Quelques-uns dans les prés bordant le ruisseau des Allées (Colombier).

Carduelis elegans, 184 — **le chardonneret.**

23 oct. Fort vol, Bas des Allées.

Pyrrhula europæa, 190 — **le bouvreuil ordinaire.**

6 oct. Tôt le matin, cris, aux Allées et dans la Pépinière Neger.

Columba palumbus, 194 — **le pigeon ramier.**

6 oct. Après-midi, un individu à Areuse (dernière observation).

Phasianus colchicus — **le faisan commun.**

Mi-octobre. On signale quelques faisans dans les taillis bordant la grève d'Auvernier.

28 oct. Matin, une ♀ est observée picorant à proximité de la ligne du tram, près Auvernier.

30 oct. Matin, une ♀ est trouvée morte à la Vigne ronde (près Auvernier).

Tetrao bonasia, 200 — **la gélinotte.**

10 oct. Observé plusieurs potles des coudriers aux abords immédiats de la Ferme-Robert.

11 oct. ♂ observé à Sommartel (1330 m.).

Gallinula chloropus, 240 — la poule d'eau ordinaire.

- 2 oct. Un groupe dans les roseaux près d'Auvernier.
- 6 oct. Même endroit: 1 ad. avec 3 juv. un peu plus gros qu'un merle.
- 23 oct. Un individu, roseaux (Auvernier).
- 29 oct. Soir 6 h., même endroit, cris de plusieurs individus.

Fulca atra, 241 — la foulque macroule.

- 12 oct. Observé 10 à 12 individus devant le Creux des Grenouilles (Auvernier).
- 23 oct. 1 individu mêmes parages.

Actitis hypoleucos, 258 — le chevalier guignette.

- 6 oct. Matinée, devant Auvernier, sur les galets (dernière observation).

Nidification de nos hirondelles.

D'après le recensement opéré à Travers (Neuchâtel) pour les hirondelles nicheuses nous communiquons à nos lecteurs, ce qui suit :

	Nids: 1912		1913
Hirondelle de cheminée (<i>Hirundo rustica</i> , 47)	49		35
Hirondelle de fenêtre (<i>Hirundo urbica</i> , 48)	53		78
	<hr/>		
	102		113

Recensement de la Béroche (Neuchâtel).

	<i>Hirondelle de cheminée, 47</i>		<i>Hirondelle de fenêtre, 48</i>	
	1912	1913	1912	1913
Gorgier	—	4	—	20
Chez le Bart (dix nids pour les deux espèces en 1912) et Derrière-Moulin	—	11	—	8
Saint-Aubin	17	25	37	59
Montalchez	9	11	1	4
Freseus	—	0	—	2
Total	—	51	—	93



Les Manchots du Jardin Zoologique de Londres. Le Jardin Zoologique de Regent's Park, à Londres, contient actuellement la plus belle collection de Manchots qu'on ait jamais vue jusqu'ici, collection qui vient d'être complétée par de nouvelles acquisitions. Les principaux spécimens sont deux Manchots royaux (*Aptenodytes Pennanti*); un Manchot de Gentoo (*Pygosceles tenuatus*), espèce qui n'a encore paru qu'une seule fois dans nos établissements scientifiques d'Europe; quatre Manchots à pieds noirs (*Spheniscus demersus*), l'espèce la plus commune en captivité; un Pingouin sauteur de rochers (*Eudyptes chrysocoma*); un Manchot à bec épais (*E. pachyrhynchus*), nouvelle espèce, originaire des îles Antipodes.

Ces oiseaux sont logés sur les bords du petit étang des Phoques, derrière les cabanes des Grues et des Cigognes. A ceux-là, il faut ajouter les Manchots de Sclater (*Eudyptes Sclateri*) et le remarquable petit Manchot