

Notes ornithologiques de la région du Bosphore.⁹⁾

Par A. Mathey-Dupraz, Colombier.

127. *Sylvia curruca*, L. — la fauvette babillarde. Espèce nicheuse, commune.

Musée Coll. améric.: 5 exemplaires.

128. *S. cinerea*, LATH. = *S. sylvia*, L. — la fauvette grise ou grisette. Ce bec-fin est nicheur, mais est moins commun que le précédent.

Musée Coll. améric.: un mâle et une femelle.

129. *S. nisoria*, BECHST. — la fauvette épervière. Cette grosse fauvette arrive au printemps, plus commune sur la côte asiatique qu'en Thrace (environs de Djendéré). Elle se reproduit dans les endroits buissonneux, où nous l'avons rencontrée: presque île de Phanaraki, dans Kourba Déré, abords de Tchamlidja, au-dessus de Cousoundjouk.

Musée Coll. améric.: 3 exemplaires.

130. *S. orphea*, TEMM. — la fauvette orphée. Dès la fin d'avril ce bec-fin faisait entendre son plein chant vigoureux du sommet des pins parasols qui se dressaient alors à côté de la place de jeu du Collège Berberian à Scutari d'Asie; plus loin, dans les jardins de Tchenguelkeui, dans les deux vallées de Buyuk et Kutchuk Ghiök Sou.

131. *S. atricapilla*, L. — la fauvette à tête noire. Cet excellent chanteur se rencontre dans la belle saison sur les deux rives du Bosphore. Il apparaît parfois en mars, sans cela dans les premiers jours d'avril.

Voici quelques dates d'arrivée:

1889	25 mars à Pancaldi	1893	26 mars Scutari d'Asie
1890	2 avril à " "	1893	28 mars à Pancaldi
1890	5 avril à Scutari d'Asie	1894	24 mars à " "
1891	18 mars " "	1894	25 mars à Scutari d'Asie.
1892	3 avril " "		

En septembre, lors de la maturité des figes, ce bec-fin ainsi que ses congénères causent de sérieux dommages à la récolte de ces fruits, dont ils sont très avides ainsi que de ceux du mûrier blanc (*Morus alba*, L.).

Musée Coll. améric.: deux mâles, une femelle.

132. *S. simplex*, LATH. = *S. hortensis*, NAUM.²⁾ — la fauvette des jardins. Espèce de passage régulier au printemps; en septembre, à son retour, elle séjourne tant que les figiers portent des fruits mûrs.

133. *Merula vulgaris*, LEACH. = *Turdus merula*, L. — le merle noir. Nicheur, commun. En 1891, le 10 février, il fait entendre son chant de bon matin (Scutari). Le 10 janvier 1892, nous entendons un mâle siffler à Bebek, sur le Bosphore, puis un autre dans le jardin de l'Ambassade de France à Péra.

Musée Coll. améric.: un couple.

■ 1) Voir „OJB.“, fasc. 2 et 7, 1919/20; fasc. 2 à 4, 7, 10, 12, 1920/21; fasc. 2, 1921/22.

134. *M. torquata*, BOIE = *Turdus torquata*, L. De passage régulier, au printemps et en automne. Dès la mi-septembre on en offrait régulièrement en vente comme gibier.

Musée Coll. améric.: Un mâle, une femelle juv. et trois mâles et une femelle, tirés à Djendéré le 10 octobre 1912.

135. *Turdus pilaris*, L. — la grive litorne. De passage en novembre.

Musée Coll. améric.: Un couple.

136. *T. viscivorus*, L. — la grive draine. Affectionne pour son séjour hivernal les prairies humides bordant la rivière de la vallée de Kiahathané. Observé, fin octobre 1891, un fort vol de «redasses» dans les vignes d'Erenkeui (Asie).

Musée Coll. améric.: Un couple.

137. *T. musicus*, L. = la grive chanteuse. Espèce observée seulement dans la mauvaise saison.

Musée Coll. améric.: Un couple.

138. *T. iliacus*, L. = la grive mauvis. Même remarque que pour les espèces précédentes.

Musée Coll. améric.: un mâle, deux femelles.

[Chaque automne nous avons pu facilement identifier les différentes espèces de grives, ces oiseaux capturés aux lacets étaient vendus, par des marchands ambulants, dans les rues de Péra].

139. *Monticola saxatilis*, L. = le merle de roches ou petrocincle. Cette espèce se rencontre dans le Haut Bosphore durant la belle saison. A fin mai 1890, nous l'avons observée au fond de la vallée de Kourba (Asie); puis, en juillet 1892, dans Kesthané Sou, vallée s'ouvrant à Sariyar, côte européenne du Bosphore.

Musée Coll. améric.: un mâle.

140. *M. cyanus*, L. = *Petrocossyphus cyana*, KEYS. & BL. — le merle bleu. Dans la collection du Collège américain se trouve un couple de merles bleus, sans indication de provenance.

141. *Ruticilla tithys*, L. — le rouge-queue. Espèce nicheuse se rencontrant aussi bien près des habitations que dans les parties rocheuses du Bosphore (carrière en-dessus d'Agatch Alty, avant Bouyouk Déré).

Musée Coll. améric.: deux mâles et quatre femelles.

Dates d'arrivée :

1889	10	avril, à Pancaldi	1892	30	avril, Scutari (Asie)
1890	6	»	1893	2	»
1891	8	»	1894	5	»
1891	9	» Scutari (Asie)			

142. *R. phoenicurus*, L. — le rossignol de murailles. De passage régulier. Quelques couples nichent dans la région, arrivée à la mi-avril. De 1890. à 1894, chaque printemps un couple habitait les cyprès de la partie inférieure du cimetière musulman de Bulbul Déré (Scutari d'Asie).

Musée Coll. améric.: deux mâles et trois femelles.

143. *R. mesoleuca* (HEMPER. & EHR.) — le rouge queue à miroir blanc. Un sujet de la collection du Collège américain est ainsi étiqueté. Nous ne connaissons pas la provenance de cette variété.

144. *Luscinia luscinia*, L. = *L. minor*, BR. — le rossignol. C'est le «Bulbul» des Turcs et des Persans, il arrive dans la région vers le 12 avril en moyenne, puis quelques jours après il fait entendre son magnifique chant.

1889	18 avril,	cimetière anglais de Férikeuy
1890	16 avril,	cimetière de Bulbul Déré, Scutari
1891	21 avril,	» » »
1892	15 avril,	rive asiatique du Bosphore
1893	20 avril,	à Flamour, derrière la Caserne du Taxim, Péra.
1894	19 avril,	Pancaldi.

Cet oiseau, durant la belle saison, se rencontre indifféremment sur les deux rives du Bosphore.

Musée Coll. améric.: deux exemplaires.

145. *L. philomela*, BECHST. — le rossignol progré ou grand rossignol (*L. major*, HENGL.). Cette espèce est de taille un peu plus grande que la précédente, elle s'en distingue encore par la vigueur de son chant. En mai 1889 et 1890, vers minuit, nous avons eu l'occasion d'écouter régulièrement un mâle de rossignol philomèle, lequel faisait entendre sa mélodie dans le jardin touffu du Collège américain de Scutari d'Asie. Au commencement de mai 1891, nous passions une soirée à Bebek sur le Bosphore; là, nous avons encore entendu le chant de ce bec-fin.

146. *Cyanecula leucocyanea*, BR. = *Erithacus suecicus*, L. — La gorge bleue à miroir roux. En octobre, au passage d'automne, nous avons observé régulièrement ce migrateur dans les prairies humides du fond de la vallée de Kiahathané.

Parfois nous avons découvert une gorge-bleue dans les cha-pelets de petits oiseaux colportés dans la grande rue de Péra; mais chaque fois nous avons reconnu que le sujet était un juv. de l'année, n'ayant point encore soit un miroir roux assez apparent soit la tache blanche caractéristique.

147. *Dandalus (Erithacus) rubecula*, L. — le rouge-gorge. Cet oiseau si familier compte de nombreux représentants dans la mauvaise saison, quelques-uns nichent dans la région, ainsi dans les cimetières anglais et latin de Férikeui, le long de la vallée de Kiahathané, aux environs de Bebek, de Bouyouk Déré. Sur la côte asiatique, il était sédentaire dans le vallon de Bulbul-déré, un peu plus haut à Tchadié, à Selamsiz et à Jeni-Mahalé de Scutari et dans le grand cimetière de cette dernière agglomération.

Musée Coll. améric.: Un couple.

(A suivre.)