

Aegialites (sp. ?) Derrière Tilghempt, cris d'un pluvier.

Vanellus vanellus, L. Observé quelques vols dans la vallée du Chélif.

Larus argentatus michahellesii, BRUCH. Devant Marseille plusieurs goélands leucophées, juv. de l'année; en pleine mer des individus adultes apparaissent, ainsi qu'avant l'arrivée à Alger. Il s'agit donc du goéland argenté à pieds jaunes.

Hydrochelidon leucopareia, TEMM. Le 23 novembre, 7 h. matin, quelques guifettes moustacs survolent l'oued Mzi, au gué de Laghouat (le pont avait été enlevé quelques semaines auparavant par une forte crue de la rivière).

Alca torda, L. Au large de Marseille on nous signale un pingouin macropère.

Puffinus. Par le travers des Iles Riou et avant l'arrivée à Alger, des vols de puffins volent autour du navire, nous déterminons le p. cendré (*P. K. Kuhlii*, BOIE), mais nous n'avons point reconnu notre vieille connaissance du Bosphore, le *P. p. yelkouan*.

Columba palumbus excelsa, Bp. En captivité à l'Hôtel C. G. T. à Boghar, deux ramiers d'Algérie, jeunes de cet automne, leurs pennes n'ont point encore atteint leur entier développement.

Streptopelia turtur arenicola, HART. Nous rencontrons la tourterelle du désert dans les oasis de Berrian, de Ghardaïa, de Beni-Isguen et de Bou-Saâda.

Pterocles (sp. ?). Après Aïn El Ibel, deux gangas au vol, dessous des ailes: blanc, noir, blanc. Nous ne pouvons en déterminer l'espèce.

Caccabis p. petrosa, GM. Dans la forêt après Berrouaghia, mais avant la descente dans la vallée du Chélif, plusieurs voliers de bartavelles. Sous les pins de Boghar et parmi les quartiers de rocher amoncelés nombreuses perdrix de roche, attirées sans doute par les baies des lentisques ou les sauterelles.

C. petrosa spatzii, REICH. Cette variété de la bartavelle, nommée perdrix du Sahara est assez commune dans la région de Tilghempt; le 23 nov., remontant de Laghouat, nous en faisons lever trois compagnies. — Les plumes des flancs présentent à la base une partie triangulaire grise, légèrement bleutée, dont le sommet a un reflet roussâtre, tandis que la base est marquée d'un trait brun-noir, suivi d'une bande d'abord roux clair, puis blanche bordée d'une partie noire, l'extrémité de la plume est rousse. Bec rouge-vif, pattes rouges, comme chez notre bartavelle des Alpes.

Comme complément à ces Notes, citons: Voyages d'études ornithologiques dans la région nord du Sahara par HENRI DE BALZAC, R. F. O. 1923/24, nos. 172 et suivants.

A propos de la Bartavelle. - *Alectoris graeca saxatilis* (MEYER).

Par O. Meylan, Mies.

La Bartavelle est un de ces oiseaux sur lesquels on a dit et répété de nombreuses erreurs, tout particulièrement au sujet

de sa distribution. Dans un travail rédigé avec tant de compétence et de soins méticuleux, l'auteur, Mr. L. LAVANDEN¹⁾, est arrivé en passant au crible les nombreuses citations embrouillées concernant sa répartition en France à la conclusion que la *Bartavelle* n'habite que la chaîne des Alpes et seulement ses parties intérieures; sa distribution (dans les Alpes françaises) coïncide à peu de choses près avec celle de la marmotte (*Arctomys marmota*, Gm.). Parmi les travaux qui ont pu fournir à Mr. LAVANDEN des renseignements précis nous en remarquons plusieurs émanant d'auteurs suisses et tout spécialement l'excellent article que notre collègue le Prof. R. PONCY a publié dans le „Bulletin de la Société Zoologique de Genève" Tome II, 1914, p. 27, «A propos de la distribution et des moeurs des Perdrix dans le département de la Haute-Savoie (Région I a, de FATIO, STUDER et VON BURG. Cat. des Oiseaux de la Suisse).»

Malgré toutes ses tentatives, Mr. LAVANDEN n'a pas réussi à constater sa présence, même à titre exceptionnel dans le Jura français; un seul auteur, MASCLER, qui affirme avoir en sous les yeux des exemplaires provenant du Bugey (partie méridionale de la chaîne du Jura) aurait, pense Mr. LAVANDEN, été induit en erreur; ce qui n'exclut pas toutefois des recherches ultérieures afin d'élucider ce point. Nous aussi, qui partageons avec la France la chaîne du Jura, entendons parfois des dires au sujet de la présence de la *Bartavelle* dans cette région montagneuse. On peut avant tout se poser comme règle qu'à défaut de pièce à l'appui, (il est en outre absolument indispensable que la provenance de celle-ci soit attestée par un témoignage digne de foi), toute autre observation soit rejetée. Des confusions avec la Perdrix rouge, *Alectoris r. rufa* (L.), qui habite certaines parties du Jura français voisines du territoire suisse sont trop faciles; les noms vulgaires, les mêmes qui servent à désigner ces deux espèces auprès des chasseurs prouvent bien que ces oiseaux ne sont pas toujours distingués — du moins par les chasseurs — ce qui ne peut qu'entretenir l'équivoque. Tout dernièrement un exemplaire naturalisé nous fut présenté dans un village au pied du Jura vaudois; suivant le propriétaire il avait été tiré au Jura, la localité même lui était inconnue, par contre on put nous indiquer le chasseur qui passait pour avoir abattu cet oiseau. Ce dernier, Mr. Ch. Duc de Lausanne voulu bien nous communiquer qu'il n'avait jamais constaté la présence de la *Bartavelle* au Jura et que l'oiseau que nous avons eu sous les yeux — censément jurassien — provenait en réalité d'une collection dont les sujets, à ce que nous apprimes ailleurs, avaient pour la plupart été achetés chez un empaillleur de Genève il y a de cela une cinquantaine d'années. On est en droit

¹⁾ „Essai sur la *Bartavelle*“, in „Le Saint-Hubert-Club illustré“, Nov. et Déc. 1923 et Janv. et Fév. 1924, par L. LAVANDEN, Inspecteur des Eaux et Forêts à Tunis (Vice-président de la Soc. Ornith. de France, Membre honoraire de la Soc. Zoologique de Genève).

de penser que le sujet qui nous occupe ne peut provenir que de la chaîne des Alpes.

Pour terminer nous donnerons ici l'avis d'un auteur que Mr. LAVANDEN ne semble pas avoir consulté; SEB. GÉRARDIN, de Mirecourt (Vosges), naturaliste attaché au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et qui pendant de longues années explora les contrées montagneuses de l'est de la France, ne connaissait pas non plus la Bartavelle en dehors de la chaîne des Alpes; dans son «Tableau élémentaire d'Ornithologie», Paris 1822, nous relevons ces quelques lignes: «La bartavelle n'est pas fort commune en France; on ne la rencontre guère que sur les hautes montagnes de nos départements méridionaux, d'où elle ne descend dans la plaine que vers l'automne pour aller chercher un abri dans les bruyères et les broussailles des petits bois. On a essayé en vain de l'acclimater dans l'intérieur de la France, où vivent les perdrix rouges; toujours elle y a péri, ou bien, lorsqu'elle en a trouvé l'occasion, elle est retournée dans son pays natal».



Vogelschutz.
Protection des oiseaux.



Zur Fischerei-Schädlichkeit der Stockente.

Von C. Schmidt, Rothenbrunnen.

Nachdem ein Meinungsunterschied in der „Neuen Bündner Zeitung“ über die Schädlichkeit der Ente für die Fische dadurch seinen Abschluss gefunden hat, dass die löbl. Regierung des Kantons Graubünden die Resultate der Magenuntersuchung veröffentlichte, erübrigt es noch in der ornithologischen Zeitschrift sich des Nähern zu befassen.

Herr Prof. Dr. STEINEMANN in Aarau hat an Hausenten nachzuweisen versucht, Schweizer. Fischerzeitung, 33. Jahrg. (1925) No. 1, S. 6 u. f., dass sie für die Fischbrut eine grosse Gefahr bedeuten und von anderer Seite wurde diese Schädlichkeit kurzweg auch auf die Wildente übertragen als Stammutter der gezähmten.

Es sei ferne von mir, die Richtigkeit dieser Resultate anzugreifen, nur so weit führen sie nach meiner Ansicht zu einer Irreführung, indem die Versuchstiere in eng abgegrenztem Raum eingesperrt waren und auf die dargebotene Nahrung von Fischlaich und Jungfischen quasi gezwungen wurden. Die natürlichen Laichstätten der Fische einesteils, die freie Auswahl der Nahrung der Enten andererseits ist dabei ausser Acht geblieben und gibt damit kein klares Bild auf die natürliche Nahrungsweise. Die vorläufig abgeschlossenen vorerwähnten Untersuchungen am Mageninhalt von Wildenten haben dies bewiesen indem nicht ein einziges Fischei noch Jungfisch gefunden wurde.