

Rauchschwalbe, Hirundo r. rustica (L.) zeigte sich erstmals vereinzelt am 13. IV. in Sion, am 15. IV. in Sierre. Auch am 20. IV. waren erst 2 Stück in Raron. Am 21. IV. war eine grosse Zahl in Sierre erschienen.

Bergpieper, Anthus s. spinoletta (L.), am 16. IV. hielt sich 1 Stück in Gesellschaft von 3 *Grünfinken, Chloris ch. chloris (L.)* und einer *Alpenbraunelle, Prunella c. collaris (Scop.)* am Rande des schmelzenden Schnees in Montana auf. Am 18. IV. traf ich von Chippis bis Moës nur einen einzigen Bergpieper am Rhoneufer.

Alpenringamsel, Turdus torquatus alpestris (Brehm). Unter mehreren *Misteldrosseln, Turdus v. viscivorus (L.)* war am 14. IV. eine Alpenringamsel in den kahlen Rebbergen von Sierre. Hart unter der Schneegrenze wimmelte es in alen Büschen unterhalb Montana von Alpenringamseln am 16. IV.

Wendehals, Jynx t. torquilla (L.) rief am 17. IV. erstmals in Sierre; am 19. IV. hielt sich ein Exemplar in den Erlen am Rhoneufer bei Branson auf.

Alpendohlen, Pyrrhocorax graculus (L.). Am 16. IV. schwebten ca. 150 Stück um das Château Mercier in Sierre, am gleichen Tag wurde eine grosse Schar auch in Montana beobachtet. Ob den Felsen von Folaterre bei Branson machte eine grosse Schar am 19. IV. schöne Flugspiele. Um die Burgen Tourbillon und Valère ob Sion kreisten oft Alpendohlen und gewöhnliche *Dohlen, Coloeus monedula spermologus (Vieill.)* am 13. und 21. IV. Am 20. IV. flogen 85 Alpendohlen um unser Hotel in Sierre, am gleichen Tag etwa 100 um die hochgelegene Kirche von Raron.

Kuckuck, Cuculus c. canorus (L.) rief am 23. IV. erstmals in Sierre.

Julie Schinz.

Observations ornithologiques.

13 octobre à 31 décembre 1926

par A. Mathéy-Dupraz, Colombier.

Hirondelle de cheminée (13 oct.) une vingtaine de juv. sur fils du téléphone, dern. observ. — *Etourneau* (25 oct.), vol de 200 aux allées, dern. observ. — *Geai commun* (17 oct.) nombreux au Bois-Devant, sur Bôle et au-dessus de Rochefort; (17 nov.) migrants dans les forêts de la Prise Roulet, de la Prise Ducommun, Crostand, la Luche, vers Pierre du Mont Boudry. — *Pic vert* (17 oct., 15 nov.) cris au-dessus de Bôle et aux Allées. — *Pic épeiche* (17 oct.) altitude de 1000 m, environs de de la Tourne, quelques migrants. — *Sittelle d'Europe* (17 oct.) cris en forêt, de 1000 à 1200 m, vers la Tourne. — *Grimpèreau familier* (nov./déc.) observ. rég. aux Allées. — *Troglodyte d'Europe* (23 nov.) chant, rive du lac. — *Cincla plongeur* (17 oct.) un couple, vers l'Usine de Combe Garot. Gorges de l'Areuse. — *Mésange petite charbonnière* (11 nov.) passage. — *Fauvette à tête noire* (oct.) chant faible d'un mâle, (1 au 8 nov.) chaque jour un mâle mange, les baies du Sureau noir (*Sambucus nigra*), au jardin; le 8 nov. en compagnie d'un merle noir mâle. — *Rouge-queue itis* (17 oct.) vis-à-vis de Jogne, à 1100 m, près la Tourne, 2 mâles juv. sur un tas de billes, (6 nov.) un mâle sur fil, près du cimetière d'Auvernier. — *Rouge-gorge* (29 oct., 6 nov.) quelques-uns dans les vergers jardins, taillis des bords du lac. Au jardin (18 nov.) un individu annelé, il est capturé le 25 décembre (portait l'amceau depuis le 21. XII. 1924. — *Traquet moiteux* (20 sept.) un cul-blanc, derrière la Tourne. — *Bergeronnette grise* (octobre/décembre) toujours quelques hochequeues le long des bords du lac. — *Berg. boarule* (17 oct.) un ind. vers Boudry; (23 oct.) 3 ind. à l'embouchure de la Serrière; novembre, quelques-unes aux Allées, dans les feuilles tombées des platanes. — *Pipit spioncelle* (17 oct.) de la Tourne au Haut-de-la Côte, nombreux migrants dans les pâturages; décembre, quelques-uns grèves de la Réserve. — *Alouette des champs* (2 nov.) vol d'une trentaine, dans un champ en jachère, près de Cortailod. — *Bruant jaune* (4 déc.) une vingtaine, vers le port d'Auvernier. — *Moineau friquet* (15 nov.) un groupe aux Allées. — *Moineau domestique* (nov.) ils mangent les baies flétries du sureau noir; décembre, ils décortiquent les châtons d'un bouleau. — *Pinson commun* (8 déc.) près de Cortailod, grands vols de migrants dans les champs; 19,2 cm de

neige, deux mâles et une femelle au jardin. — *Verdier* (30 déc.) une dizaine vers Auvernier. — *Céni* (2 nov.) 3 ind. sur capitales de *Scabiosa* et sur tiges de *Diplotaxis*. — *Venturon alpin* (17 oct.) petit vol, vers Thomasset-Jogne, 1135 m, près de la Tourne. — *Chardonneret* (2 nov.) deux ind. sur capitules de *Leontodon autumnalis*, sur la Forêt (Boudry). — *Grand Coq de bruyère*, au commencement de novembre, en période de chasse, un coq est tiré près de la Chaille, vers 1390 m (montagne du Creux-du-Van); un second près du chalet Straubhaar, vers 1320 m (Mont Boudry). — *Gélinotte*, fin septembre, une poule des coudriers égarée dans les roseaux de la Réserve. — *Poule d'eau*, octobre à 31 décembre, trois couples du Bas des allées à Auvernier. — *Râle d'eau* (7 nov.) on m'apporte un bel ind. pris par un chat à Auvernier. — *Foule noire*, dans la Réserve et ses abords immédiats 180 à 200 ind. — *Canard sauvage* (nov.) un volier d'une douzaine, se tient dans la phragmitée de la Réserve. — *Canard siffleur trappé* (29 nov.) on tire quelques ind. de cette belle espèce, devant Faoug, lac de Morat. Un mâle splendide est apporté à Auvernier. — *Canard milouin* (20 oct.) une vingtaine, vers l'extrémité du débarcadère à Auvernier (1 observ.), à fin déc. ils sont là. — *Canard milouinan* (6 déc.) groupe de 6 vers les Ruaux et 5 près du Quai Suchard, par forte bise. — *Can. morillon* (30 oct.) vol de 18 à 20, vis-à-vis de Champ Bougin (1 observation). — *Grèbe jougris* (23 déc.) 4 ind. dans le port de l'Evole. — *Grèbe castagneux* (11 nov.) un seul grèbion, Auvernier; 8 et 15, groupe de neuf castagneux, vis-à-vis de la Viticulture à Auvernier; 20, même endroit, un grèbion isolé et groupe de 5.

BÜCHERTISCH

Bibliographie.

Ivar Hortling, Das Vogelleben bei Ytterö im Sommer und Herbst 1926. Sonderheft der « *Ornis Fennica* », 237 Seiten Tafeln, Karten usw. Helsingfors 1927. Bezug durch die Finnische Ornithologische Vereinigung.
Preis

Der junge finnische ornithologische Verein unter der zielbewussten Leitung von *Dr. Ivar Hortling* hat es innert sehr kurzer Zeit zu einer Beobachtungsstation an der finnischen Westküste, am Bottnischen Meerbusen bei Ytterö (in der Nähe von Björneborg), gebracht. Dieser Posten wurde in der Zeit vom 15. Juli bis zum 15. Oktober 1926 durch den Verfasser besetzt, der das Gebiet täglich beging und ausserordentlich wertvolle Angaben sammelte. So stellte er fest, dass z. B. *Calidris alpina*, *minuta* und *temmincki*, die für Finnland als « Küstenwanderer » galten (nach dem grossen *Palmen*) quer durch das Land ziehen. Dies verwundert weiter nicht, treffen wir doch diese Vögel an unseren schweizerischen Binnenseen an, z. B. am Beobachtungsgebiet Fanel am Neuenburgersee). Eine Menge wertvoller biologischer Daten wurden zusammengetragen. So ist ein äusserst wertvolles Werk entstanden, an dem die Vogelzugforschung nicht vorbeigehen darf. Es zeugt von grossem Fleiss, reichem Wissen und wissenschaftlicher Tüchtigkeit. des Verfassers.
A. H.

Nachdruck von Originalarbeiten nur mit genauer Quellenangabe und Einwilligung der Verfasser gestattet. — Für den Inhalt der Aufsätze sind die Verfasser selbst verantwortlich. — La reproduction d'articles originaux n'est autorisée que moyennant le consentement de l'auteur et indication de provenance.

La rédaction laisse aux auteurs l'entière responsabilité de leurs articles.
Red.: *A. Hess* in Bern, Spitalg. 26. — Prof. *A. Mathey-Dupraz* à Colombier.

Druck und Expedition: E. Flück & Cie., Bern