

était complète et régulière³⁾. Pourquoi dans d'autres cas une femelle peut atteindre le nombre de 5 œufs ? — C'est assurément difficile d'expliquer les causes d'une telle fécondité. Le Rev. Francis C. R. Jourdain répondit à une question que je lui posai à ce sujet, que l'abondance de nourriture pendant l'hiver précédant la saison de ponte pouvait jouer un certain rôle. Pour le moment aucune constatation ne m'autorise à me prononcer⁴⁾.

Colombin, *Columba o. oenas* L. A l'inverse de la Buse, l'amplitude chez le Colombin est réduite à zéro. Les cas où le nombre régulier de 2 œufs n'est pas atteint ou se trouve dépassé doivent être des anomalies (pathologiques ?). Cette régularité vraiment surprenante est un caractère spécifique avant tout d'ordre phylétique, si prononcé que les facteurs qui tendent à faire varier le nombre d'œufs chez les autres oiseaux se montrent sans effet chez le Colombin, comme en général chez tous les représentants de l'ordre des *Columbae*.

Dans « Beitr. z. Fortpflanzungsbiologie der Vögel », 1926, p. 74, j'ai discuté le cas de 2 pontes composées en apparence de 3 œufs; un examen attentif montra que dans ces deux cas un troisième œuf étranger se trouvait accidentellement aux côtés d'une ponte régulière de 2 œufs. Ceci permet bien de conclure que la ponte de 3 œufs (ou d'avantage) est sensiblement plus rare que certaines données le laisseraient croire et qu'avant de l'admettre on doit envisager l'éventualité de plusieurs pondeuses.

KLEINERE MITTEILUNGEN

Communications diverses.

Rauben des Wanderfalken. Es ist anzunehmen, dass die Raubvögel hauptsächlich zur Zeit, wo sie Junge im Horst haben, sich durch vermehrte Räubereien bemerkbar machen. Als wieder einmal Klagen über den Wanderfalken laut wurden, frug ich verschiedene Brieffaubenzüchter an und erhielt u. a. von Herrn F. Aebi in Herzogenbuchsee, einem so eifrigen wie erfolgreichen Züchter, eine Antwort (1923), die auch folgendes enthält :

« Auf Ihre Frage, wann der Wanderfalke unter den Taubenbeständen am meisten schade, diene Ihnen zu wissen, dass von März bis Anfang April, wenn die meisten Zugvögel kommen, sich auch die Raubvögel sichtbar mehren. Dies wissen meine Sportkollegen alle. Man meldet einander : Ein Wanderfalke ist im Durchzug, hütet Eure Tauben ! Nun sperrt man die Tauben für einige Tage ein. Wir vermuten, dass die durchziehenden Falken einige Tage sich hier aufhalten (ca. eine Woche). Ende März hat man dann wieder Ruhe vor dem Wanderfalken. Bei uns holt er sich dann Ende Mai und im Juni vom Jura her seine Opfer von neuem. »

Es ist wahrscheinlich, dass nicht eine Woche lang der nämliche Wanderfalke in der Gegend bleibt, sondern dass einige Tage lang ein Durchzug stattfindet.

Ende Mai und im Juni haben die am Jura brütenden Wanderfalken Junge aufzufüttern. A. H.

³⁾ Cf. les intéressantes remarques à ce sujet : Dr. R. Thielemann, Einzeleier vom Mäusebussard, Zeitschr. f. Oologie, 1905, p. 86.

⁴⁾ La grosseur, soit la capacité des œufs de Buse varie également dans de grandes proportions; la variation de 2 œufs normalement constitués peut atteindre le rapport de 58 : 100.