

## Observations ornithologiques comparées faites sur la côte suisse du Lac Léman.

Par Robert Poncey.

Ces notes ont été prises à bord d'un bateau à vapeur les 15, 22 et 30 avril 1933.

Le 15 soufflait une légère brise du N.E. et le beau temps durait depuis 26 jours.

Le 22 (après mauvais temps et bise les 18, 19, 20, 21 avec neige à 900 m. d'alt. le 20), le temps est beau avec bise, après blanche gelée. Peu à peu le ciel se couvre et de 9 h. 30 à 16 heures, ce ne sont que rafales de neige. Le sol est blanc depuis les sommités jusqu'au bord du lac.

Le 30, après lune, un chaud soleil se lève, puis tout à coup à 7 heures le brouillard qui s'était formé sur la campagne est chassé par la brise sur toute la surface du petit lac où il forme une couche épaisse d'une centaine de mètres de hauteur. Il est si dense que jusqu'à Nyon la sirène du bateau fonctionne et que deux vigies signalent les débarcadères visibles à moins de cent mètres. Nous sommes blancs de givre. Seul le chant ininterrompu des Rossignoles nous signale la proximité de la côte. Depuis 9 heures, temps magnifique.

### Milan noir (Schwarzbrauner Milan).

Avril	Embouchure du Rhône	Villeneuve	Territet à Vevey	Rivaz à Ouchy	St-Sulpice à St-Prex	Allaman à Nyon	Nyon à Genève	Totaux
15	2	0	4	2	0	1	0	9
22	3	15	12	3	0	1	2	36
30	2	45	13	2	0	1	4	67

### Faucon hobereau (Baumfalk).

1 individu chasse sur le lac devant Coppet le 22 à 17 heures.

### Martinet noir (Mauersegler).

Le 30, les Martinets crient au-dessus du brouillard à 7 heures (Genève) 2 individus à Villeneuve.

### Hirondelle rustique (Rauchschwalbe).

Le 22, de nombreux individus chassent au ras de l'eau devant les phragmitaies, après blanche gelée (température de l'air: min. 0° C. max. 7° C. Température de l'eau: + 9° 7 C.

Voici l'évaluation approximative de ces oiseaux:

Avril	Pointe à la Bise	Mies	Promenthoux	Boiron	Morges St-Sulpice	Vidy	Villeneuve
22	20	0	100 ?	100 ?	2000 ?	50	50
30	0	68	0	0	0	0	10

### Hirondelle de fenêtre (Stadtschwalbe).

Le 22 quelques individus à Villeneuve.

**Foule macroule (Wasserhuhn).**

Avril	du Rhône à Villeneuve	Port de Villeneuve	Lutry Ouchy	Morges St-Sulpice	Rolle
15	plusieurs centaines	45	15	150	15
22	» »	25	2	0	0
30	augmentent	0	0	0	0

**Fuligule morillon (Reiherente).**

Avril	Saint-Sulpice	Rolle	Grangettes
15	30 m. et f.	0	0
22	20 m. et f.	4 m. 1 f.	0
30	0	6 m. 1 f.	2 m. 2 f.

**Garrot vulgaire (Schellente).**

Le 15, à Bellerive un couple d'adultes se lève devant notre bateau.

**Harle bièvre (Grosser Säger).**

Le 15 à Céligny 1 m. passe au ras de l'eau en allant à l'embouchure de la Promenthouse.

Le 22 à Bellerive un couple nage devant le bateau à cinquante mètres du bord. Il nous évite à la nage; le mâle ayant la tête enfouie dans les épaules, suit la femelle nageant le coup tendu. Puis lorsque nous nous trouvons éloignés d'environ 500 mètres, tous deux partent au vol, la femelle la première, et vont décrire des cercles au-dessus du bois de Bellerive où ils finissent par disparaître.

Aux Etaloges entre St-Prex et Chanivaz, 2 m. et 4 f. prennent leur vol, à cinquante mètres devant le bateau puis vont se poser au ras de la grève.

Le 30, un mâle venant de la Promenthouse à une centaine de mètres en l'air passe au-dessus de Nyon et disparaît sur terre dans la direction de Céligny.

**Mouette rieuse (Lachmöwe).**

Avril	La Venoge	Vidy	Ouchy	Rivaz	Vevey	Clarens	Territet	Bouveret
15	0	0	23	22	283	200	14	0
22	0	208	22	100	350	250	0	70
30	200	100	0	89	350	120	0	0

**Hirondelle de mer Pierre-garin (Flußseeschwalbe).**

Avril	Versoix	Nyon	Rolle	St-Sulpice	Ouchy	Lutry	Vevey
15	4	1	0	4	1	1	1
22	0	0	0	4	0	0	2
30	0	0	0	12	0	0	0

**Guifette noire (Schwarze Seeschwalbe).**

Le 30 par pluie à verse, l'après-midi, nombreux individus chassant les éphémères à la surface de l'eau:

St-Sulpice	La Venoge	Etaloges	Rolle	Mies	Vieux Port de Versoix
50	70	5	2	50	80

**Grèbe huppe** (Haubentaucher).

Avril	Villeneuve	Rivaz	Lutry	St-Sulpice	Morges	Boiron	St-Prex	Rolle	Mies
15	140	1	0	0	0	0	12	0	0
22	augmentent	0	4	2	30	3	0	11	0
30	augmentent	0	4	0	0	8	0	18	100 ?

Le 30, à 17 heures à Mies une centaine d'individus à collerette, jouent, se poursuivent, plongent, volent devant le bateau. Forte pluie (après brouillard le matin et clair de lune la nuit précédente).

**Grèbe oreillard** (Ohrensteissfuss).

Le 15, un individu en nocés à Vevey et au Bouveret et un individu en nocés les 22 et 30 à Nyon.

Le 15, dans le Creux de Rolle, quinze individus groupés prennent le vol à notre approche. Ils s'élèvent facilement à une dizaine de mètres au-dessus de l'eau et filent au N. E. C'est la première fois que je vois migrer cette espèce.

**Beobachtungen im Schweizerischen Nationalpark.**

20. August bis 1. September 1933.

Von Ch. Guggisberg, Bern.

Die nachstehenden Aufzeichnungen sind das Ergebnis eines zweiwöchigen Aufenthaltes im Nationalpark und seiner Umgebung. Das Beobachtungsgebiet umfasst das Val Trupchum, das Val Cluozza, die Gegend des Ofenberges, sowie die ausserhalb des Parkes gelegene rechte Seite des Inntales zwischen Scanis und Cinuskel. Ueberall finden sich an den Talhängen dichte Koniferenwälder (Fichte, Föhre, Lärche, Arve), die bei ca. 2100 m in die Legföhrenbestände übergehen; diese reichen bis ca. 2300 m. Unten in den Tälern findet man in die Nadelholzbestände eingestreut etwas Birken, Erlen und Zitterpappeln. Reich ist der Wald meistens an Sträuchern: Alpenrosen, Wacholder, Heidelbeeren, Preisselbeeren usw. Ueber 2300 m liegen die Alpweiden, die allmählich in Felsen und Geröllhalden übergehen. Während der zwei Wochen hatte ich nur einen Tag (22. August) wirklich schlecht Wetter mit Regen, Nebel und Schnee bis unter die Waldgrenze. An den andern Tagen war das Wetter sehr schön bis wechselnd bewölkt.

An Säugetieren konnte ich beobachten: Edelhirsch, Reh, Gemse, Steinbock, Hase (wahrscheinlich Schneehase) und Murmeltier; besonders interessant erscheint mir die Beobachtung eines Eichhörnchens auf Alp Murtèr bei 2700 m, also weit über der Waldgrenze.

Das ornithologische Ergebnis fiel besser aus, als ich erwartete. Ich konnte während der verhältnismässig kurzen Zeit in dem oben umgrenzten Gebiet 35 Spezies feststellen; insgesamt sind nach Corti im Nationalpark ungefähr 70 Arten beobachtet worden, wovon eine Anzahl Durchzügler.