

Kleinere Mitteilungen und Feldbeobachtungen.

Observations ornithologiques

par Robert Poncy

I.

Le Grand Harle (*Mergus merganser*), hôte nouveau pour la petite jetée du port de Genève.

Dans Ala, août 1935, les Anatidés hôtes de la jetée étaient: Sarcelle d'hiver, Sarcelle d'été, Milouin, Morillon, Harle huppé; puis, dans O. B. janvier 1942, Canard siffleur. A cette liste s'ajoute le 18 janvier 1943, une femelle adulte de Grand Harle qui, séjournant dans le port depuis deux mois, vient faire sa toilette sur l'enrochement.

II.

Station ornithologique du Port de Genève et régions environnantes.

Le 11 octobre 1942, 9 Grèbes castagneux de passage, nagent en plein lac entre Bellevue et Versoix, puis ils s'envolent au sud-ouest. Le 19 oct. il y en a 75 dans le Port de Genève en compagnie de deux Grèbes à cou noir.

Le 11 oct., 2 Grands Cormorans sont posés aux Grangettes, près Villeneuve, l'un sur l'enrochement de la jetée, l'autre au sommet du mât, tandis que deux autres individus pêchent dans le port du Bouveret. Du 31 oct. au 6 nov., par temps pluvieux très sombre, 3 individus séjournent sur la prise-d'eau, au large du quai Wilson (Genève).

Le 27 sept. 1942, au crépuscule, après chute de neige, à Saanen, deux Hérons cendrés passent à l'alt. de 1200 m. s. m., venant de Zweisimmen et allant à Rougemont. Le 10 oct. à 15 h., un individu franchit le Vuache à Frangg (Hte. Savoie). Le 11 oct., 4 individus sont posés sur le môle de la Promenthouse.

Le 22 déc., 3 Oies des moissons passent au vol au ras de l'eau, dans le brouillard, devant Bellerive. L'une d'elles abattue, pèse 4 kilogr. 350.

Durant le mois d'octobre, dans le Port de Genève, des individus isolés ou de petits groupes des espèces suivantes se sont montrés: Canard Colvert, Sarcelle d'hiver, Canard chipeau, Siffleur, Pilet, Souchet; Brante roussâtre (un m. ad. le 13 nov. 1942, tandis qu'un autre est tiré sur le lac le 23 février 1943). Un jeune Canard garrot qui séjourne dans le port depuis le 21 nov. est rejoint le 1er décembre par 10 autres individus parmi lesquels cinq mâles adultes.

Les Fuligules Milouin et Morillon, avec un ou deux jeunes du Milouinan et du Nyroca se dénombrent comme suit:

Oct. 19, 22, 27, 30; Nov. 4, 20; Déc. I. Milouins 92, 200, 800, 1000, 1200 dès lors ils se dispersent. Morillons de 20 passent à 450.—

Le 13 sept., un mâle de Canard pilet en plumage d'été, barbote parmi les Lemnas du canal de Choulex. Il prend son vol et va se poser, en compagnie de trois Pigeons colombin, au milieu des chaumes d'un champ de blé coupé, où il reste immobile. Après l'avoir longtemps observé, je le fais partir. Il prend rapidement de la hauteur et disparaît au sud-ouest, dans le ciel bleu. J'entends nettement son cri: cruck... cruck. (Voir Naumann pl. 7 et pp. 116, 117, Vol. X.)

Le 30 oct., 4 *Harles huppés* se posent tout près du Jardin anglais, puis ils repartent quelques instants après.

Le 30 août à 8 heures, par beau temps, plusieurs milliers de *Mouettes rieuses* de passage, sont groupées serrées devant Bellevue et forment une tache blanche au milieu du lac. Le 11 oct. à 9 h., par vent d'est, et avant forte pluie, un millier de *Prieuses* de passage, descendant de grande hauteur, viennent se poser serrées sur l'eau, derrière la pointe de la Promenthouse. Le 21 oct., après neige à l'alt. de 1200 m. et baisse de la température, les premiers individus prennent le pain aux fenêtres. Le 2 déc., par -4° c et beau temps, un vol d'une centaine de *Rieuses* pâture tout l'après-midi derrière une charrue qui laboure près de Chougny.

Le 6 avril 1942, un couple de *Sternes Pierre-garin* se livre à la pêche le long des sables de Saint-Sulpice.

Le 21 août, par beau temps, chaud et calme, de nombreux individus de la *Guifette épouvantail* chassent les insectes sur le lac Versoix et Bellevue, et le 5 sept. il y en a encore deux devant Coppet.

III.

Albinisme partiel.

Dans le Port de Genève: Une *Foulque macroule* avec le dos blanc et une autre avec le ventre blanc. Une femelle de milouin adulte avec la tête et le plastron de la couleur habituelle, mais tout le reste du corps blanc avec des taches couleur chamois clair.

Winterbeobachtung von Spiessenten (*Anas acuta* L.) am Bodensee

Anlässlich meines letzten Studienaufenthaltes am Bodensee am 20. und 21. Februar 1943 gelangten im Hafen Arbon vier Paar und bei der Achmündung weitere drei Paar Spiessenten zur Beobachtung. Die Erpel befinden sich im schmucken Prachtkleide mit rotbraunem Kopfe, dem vielen Weiss im Gefieder und den langen spießförmig verlängerten Mittelschwanzfedern. Die einzelnen Paare hielten stets zusammen, und gründelten eifrig. Der Wasserstand des Bodensees ist zurzeit sehr niedrig (Pegelstand nur 402.72 m). Beidseits der Achmündung breitet sich eine ausgedehnte Schlammfläche aus. Dasselbst hielten sich nebst den Spiessenten auch ca. 120 Paar Stockenten, ca. 40 Paar Krickenten und zwei Weibchen der Moorente auf, die am Wasserrand mit eingesteckten Köpfen schliefen oder zum kleinen Teil Nahrung suchten. Von den Krickenten war ständig ein hellklingender Ruf zu hören. Es ist mir leider nicht bekannt, seit wann die Spiessenten schon anwesend waren. Ob der milde Winter einen Einfluss auf das frühzeitige Eintreffen dieser Entenart am Bodensee hat? Mitteilungen über Beobachtungen anderer Ornithologen wären sehr wertvoll.

Conr. Stacheli, Ennenda (Glarus).

Beobachtungen auf Braunwald und in Herrliberg

Beobachtungen auf Braunwald. 1200—1400 m 23. Dezember 1942 bis 17. Januar 1943. Wetter anfangs warm, sonnig, Boden schneefrei, dann tagelanger Schneefall, nachher hell und kalt.