


sachant très bien venir chercher sa nourriture: escargots (*Helix hortensis*, *pomatia*, *aspersa* et *nemoralis*), limaces (*Arion rufus*), grillons (*Gryllus campestris*), poissons (juv. *Perca fluviatilis* et *Alburnus lucidus*), juv. moineaux, mésanges etc. morts, juv. souris, mulots, du foie et de la rate de bœuf, de la viande crue de veau et de bœuf, quelque peu de viande bouillie.

Un soir, cette hulotte a avalé l'une après l'autre, sans arrêt dix jeunes souris, à moitié de leur grosseur. Une autre fois, un gros mulot (*Mus sylvaticus*) d'une becquée! Un pinson ♂ ad., ayant une aile cassée, et laissé quelques instants dans son voisinage est de suite saisi, tué et dévoré; 20 heures après, le rapace rend une forte boulette dans laquelle on distinguait le bec, les plumes et les gros os du pinson. Cette chouette a été mise en liberté, porteuse de la bague 6001. A. M.-D.



Der Mai 1913.

Kalt und unfreundlich ist der „Wonnemonat“ ins Land gezogen, so dass die berühmte Parodie von den springenden Knospen und den neuheizten Ofen wieder zu ihrem Rechte kommen konnte! Niedrige Temperaturen und schroffe Witterungsumschläge bildeten den Charakter der ersten Hälfte des Monates. Am 8. Mai betrug der Temperaturunterschied in Bern zwischen morgens 7 Uhr und mittags 1 Uhr 11,4° C. (5/16,4° C.). In der Nacht vom 11./12. Mai (Pfingsten) ist in der ganzen Schweiz ein erheblicher Temperatursturz eingetreten. Bis über 1000 Meter hinunter fiel Schnee: in La Chaux-de-Fonds sank das Thermometer auf 4 Grad unter Null. Anzahl der Tage mit Niederschlägen in Bern = 18. Niedrigste Temperatur am 5. Mai = 3,9° C., höchste am 22. Mai = 26,2° C.

Beobachtungsberichte.

Waldkauz, 38 (*Syrnium aluco L.*), **Schleiereule**, 39 (*Strix flammea L.*), **Waldohreule**, 42 (*Otus vulgaris Flemm.*). *Chouette hulotte*. — *Chouette effraye*. — *Hibou moyen-Duc*. — Depuis que je suis préparateur et que je fais des observations ornithologiques (ca. depuis 12 ans) je n'ai vu et reçu autant de rapaces nocturnes que ce printemps. Les *moyens-Ducs* surtout sont en grand nombre et le soir on entend crier jeunes et vieux dans tous nos bois. La *Hulotte* paraît être moins abondante, par contre l'*Effraye*, d'habitude assez rare chez nous, est commune cette saison.

William Rosselet, Renan (Jura bernois).

- Mauersegler**, 46 (*Cypselus apus* L.). 4 mai, la campagne est couverte de neige, les martinets sont repartis. William Rosselet, Renan.
- Am 3. Mai auf Rauhflühberg die ersten gesehen. Chr. Hofstetter.
- Grauer Fliegenschnäpper**, 84 (*Muscicapa grisola* L.). Am 9. Mai den ersten im botanischen Garten in Bern. Karl Daut.
- Am 9. Mai auf Rauhflühberg die ersten gesehen. Chr. Holstetter.
- Schwarzrückiger Fliegenfänger**, 86 (*Muscicapa luctuosa* L.). Am 1. Mai sah ich im botanischen Garten in Bern das erste ♀, am 2. Mai ein ♂, seither keine mehr. Am 10. Mai wurde ein ♂ an der Tiefenaustrasse tot aufgefunden. Karl Daut.
- Am 6. Mai beobachtete ich in unserm Garten ein altes ♂, seither habe ich den Trauerfliegenfänger nicht mehr gesehen. Diessbach b. Büren, 23. Mai 1913. Max Käser. Präparator.
- Flussrohrsänger**, 115 (*Locustella fluviatilis* M.-W.). Letzter Tage hörte ich den Gesang des Flussrohrsängers. H. Mühlmann, Aarberg, 3. Juni 1913.
- Gartengrasmücke**, 127 (*Sylvia hortensis* auct.). Erster Gesang im botanischen Garten in Bern am 7. Mai, ein Paar beobachtet. Karl Daut.
- Braunkehliger Wiesenschmätzer**, 146 (*Pratincola rubertra* L.). Am 8. Mai ein Paar auf Rauhflühberg gesehen; hier zum ersten Mal beobachtet. Chr. Hofstetter.

Zaunammer, 165 (*Emberiza cirlus* L.). Unterhalb Kerzers habe ich am 25. Mai einen besondern Ammergesang gehört; nach Voigt wäre es derjenige des Zaunammers: „Cirrl, cirrl-cirrl, Cirrl-cirrl-cirrl.“ H. Mühlmann.

Brutkalender.

(Bericht von Chr. Hofstetter, Rauhflühberg.)

- Star**, 57 (*Sturnus vulgaris* L.). Vom 20. bis 24. Mai sind auf Rauhflühberg die jungen Stare ausgeflogen.
- Rabenkrähe**, 62 (*Corvus corone* L.). Am 3. Mai fand ich ein Nest mit vier leicht bebrüteten Eiern.
- Spechtmeise**, 76 (*Sitta caesia* Mey.W.). Am 31. Mai ist eine Brut ausgeflogen.
- Zaunkönig**, 91 (*Troglodytes parvulus* L.). Am 28. Mai fand ich ein Nest mit frisch ausgeschlüpften Jungen.
- Fitislaubvogel**, 105 (*Phyllopleuste trochilus* L.). Am 26. Mai fand ich ein Nest mit kleinen Jungen.
- Weidenlaubvogel**, 106 (*Phyllopleuste rufa* Lath.). Am 15. Mai fand ich ein Nest mit 5 Eiern.
- Dorngasmücke**, 123 (*Sylvia cinerea* Lath.). Am 23. Mai fand ich zwei frische Gelege zu 5 Stück.
- Kohlamsel**, 128 (*Merula vulgaris* Leach.). Am 16. Mai fand ich ein Nest mit 4 halbgrossen Jungen.
- Singdrossel**, 132 (*Turdus musicus* L.). Am 14. Mai zwei neue ausgeraubte Nester gefunden, am 16. Mai fand ich eines mit 5 kleinen Jungen.
- Gartenrotschwanz**, 138 (*Ruticilla phoenicurus* L.). Am 16. Mai fand ich in einem Scheuerlein ein Nest mit 5 Eiern.

Rotkehlchen, 142 (*Dandalus rubecula L.*). Am 28. Mai fand ich ein verlassenes Gelege von 5 Stück.

Weisse Bachstelze, 148 (*Motacilla alba L.*). Auf Ramisberg hat ein Paar sein Nest in einem bewohnten Zimmer gebaut und eine Brut grossgezogen. Mitte Mai sind die Jungen ausgeflogen.

Goldammer, 164 (*Emberiza citrinella L.*). Am 15. Mai fand ich ein Nest mit nackten Jungen, am 27. Mai ein anderes mit 4 Eiern.

Buchfink, 177 (*Fringilla coelebs L.*). Am 25. Mai sah ich ein Nest mit bereits flüggen Jungen.

Hohltäube, 195 (*Columba oenas L.*). Am 23. Mai sind die ersten Jungen ausgeflogen.

Auerhuhn, 198 (*Tetrao urogallus L.*).

Am 1. Mai a. e. wurde mir eine kräftige Auerhenne zur Präparation überbracht, welche tags zuvor in der Nähe von Kehrsatz bei Bern auf einer Wiese noch halblebend aufgefunden wurde. Die Henne wies keinerlei Spuren von Schusswunden auf, dagegen hatte dieselbe unter dem linken Flügel längs des Rumpfes einen 14 cm. langen Hautriss. An der Kehle fehlten viele Federn und es wurden daselbst kleinere Bisswunden konstatiert. Alle Anzeichen lassen darauf schliessen, dass die arme, harmlose Henne im Gurtenwald während ihres Brutgeschäftes einem kleinen Raubtier, wie Hermelin oder Marder zum Opfer gefallen ist. Durch Fliegen wollte sich dieselbe vielleicht noch retten.

Dass sich im Grauholz und auf dem Belpberg schon Auerhühner vorgefunden haben, ist eine bekannte Tatsache, dass aber diese scheuen Vögel ihr Gebiet bis in den nahe bei Bern gelegenen Gurten ausgedehnt haben, dürfte als interessante Neuigkeit angesehen werden. Bichsel.

Osservazioni sul ritorno degli uccelli nella primavera 1913.

Prato Carasso, li 14 maggio 1913

Ho fatto in questi giorni queste osservazioni sull' arrivo degli uccelli: Credevo, che fossero ritornate poche **rondini**, invece dal principio di maggio fino ad oggi, il passaggio è molto accentuato, sopra tutto quello della **rondine di casa** (*Hirundo rustica L.*). Il giorno 11 son passati una bella quantità di **Rondoni** (*Cypselus apus L.*). Jeri si sentì per la prima volta il canto della **quaglia** (*Coturnix dactylionans Meyr.*) Rodolfo Paganini, Bellinzona.

Journal ornithologique, mai 1913.

A. Mathey-Dupraz.

Milvus ater, 6 — le milan noir.

Mai. Chaque jour un ou deux individus errent le long des rives du lac. Un ♂♀ se tient dans les environs de Serrières et devant Neuchâtel; un autre, dans les parages de l'embouchure de l'Areuse et du Bied.

25 mai. Cinq milans, volent de compagnie, faisant la chasse aux grenouilles, au-dessus des fossés des tourbières près d'Anet.

Cerchnis tinnunculus, 7 — la cresserelle.

Mai. Aucun individu dans notre région.

2 mai. 3 criblettes semblent jouer en volant au-dessus d'une petite forêt (Witzwil).

Accipiter nisus, 16 — l'épervier.

6 mai. Seule observation. Matinée, par pluie continue, ce rapace chasse les moineaux au alentours du collège.

Buteo vulgaris, 25 — la buse.

11 mai. Un couple a établi son aire dans le fond du Creux du Van.

22 mai. Observé une buse (Châtel de Boudry).

Athene noctua, 36 — la chouette chevêche.

8 mai. Soir 8 heures, observé un ♂♀, Allées des maronniers.

26 mai. Midi, une chevêche en chasse dans les boqueteaux du Grand Verger. Une autre, dans l'allée des maronniers (Colombier).

Syrinum aluco, 38 — la chouette hulotte.

9 avril. 2 juv. chats-huants sont capturés dans la forêt de Voëns (Weber). (Voir communication.)

Fin avril. 1 juv. hulotte trouvée dans la région des Roches jaunes, au-dessus de Rochefort (M. Thiéband.) (Voir communication.)

18 mai. Cri d'un individu, 2 h. après-midi, au-dessus des Cernées (950 m.), près de la Ferme Robert.

Strix flammea, 38 — la chouette effraye.

2 mai. Minuit, cri des effrayes sur le toit du château (Colombier),

10 mai. 9 h. du soir, cri, nuit sombre, même endroit.

Osus vulgaris, 42 — le hibou moyen-Duc.

9 mai. Juv. hibou capturé près de Perreux (Boudry). (Weber.) (Voir communication.)

Caprimulgus europaeus, 44 — l'engoulevent.

10 mai. Observé un individu tapi sur une grosse branche d'un poirier, près de la gare du tram à Cortaillod.

Cypselus apus, 56 — le martinet.

8 mai. Disparus depuis le 30 avril, ils reparaissent nombreux.

Hirundo rustica, 47 — l'hirondelle de cheminée.

1er et 2 mai. Sont signalées très nombreuses sur les antennes Jaquerod à Neuchâtel.

8 mai. Un couple recommence à construire son nid (Colombier), dès le 28 mai la ♀ couve.

Hirundo urbica, 48 — l'hirondelle de fenêtre.

Mi-mai. Commencent à construire.

Hirundo riparia, 49 — l'hirondelle de rivage.

Premiers jours de mai, quelques-unes sur l'Areuse (embouchure et Grand-champ).

Cuculus canorus, 51 — le coucou.

7 mai. Chant dans nos environs (l'espèce est peu représentée cette année).

25 mai. Chant près d'Anet, La Sauge, Witzwil, Les Genêvriers (Marin).

Oriolus galbula, 55 — le loriot.

7 et 8 mai. Cri: Grand Verger, embouchure d'Areuse.
9 mai, matin 5 h., cris d'appel et chant aux Allées.

Sturnus vulgaris, 57 — l'étourneau.

Mi-mai. Juv. hors du nid: Allées et prés d'Areuse; le 22 mai, ils sont disparus.
23 mai. Quelques couples occupent de nouveau, leur place de nichée sur certains toits du village.

Corvus corone, 62 — la corneille noire.

15 mai, après-midi 3 h., vu ♂♀ poursuivant un juv. étourneau, l'un des poursuivants le saisit même un instant dans son bec, mais le sansonnet put s'échapper. De nombreux méfaits sont encore à signaler, prouvant la nocivité grande de l'espèce pendant la période de nidaison des petits oiseaux.

Gecinus viridis, 68 — le pic vert.

7 mai. Dans la pinède du Grand Verger, observé 3 juv.

Junx torquilla, 75 — Torcol.

Entendu son cri chaque jour et observé l'oiseau régulièrement.

Larius collurio, 83 — la pie-grièche écorcheur.

13 mai. Première observation: ♂ Pélénierie Nerger, ♂ à Chenailletaz
♂ Grand Verger et ♂ Grandchamp.

22 mai. ♂♀ à Brassin et au Chânet de Boudry.

Muscicapa griseola, 84 — le gobe-mouche gris.

10 mai. Nid sur un érable (var. à feuilles rouges).

25 et 26 mai. Juv. hors nid, à Epagnier et aux Allées.

Troglodytes parvulus, 91 — le troglodyte.

18 mai. Chant un peu partout dans la région du Creux du Van: au Plan (950 m.), à la Ferme-Robert (981 m.), au chemin de la Paroisse (1180 m.) à la Déracinière (1150 m.).

21 mai. Juv. hors nid aux Allées.

Cinclus aquaticus, 92 — le cincle.

11 mai. ♂♀ au Saut de Brot et aux Clées (Gorges de l'Areuse).

29 mai. ♂♀ aux Clées.

Parus major, 96 — la mésange charbonnière.

20 mai. Juv. bien plumés, dans nid (Collège).

25 mai. Juv. hors nid, la Sauge.

26 mai. Juv. hors nid, embouchure de l'Areuse.

31 mai. Colombier et environs, juv.

Acredula caudata, 99 — la mésange à longue queue.

26 mai. Ad. et juv., au Bied.

Regulus cristatus, 102 — le roitelet huppé.

Mai. Chaque jour, sur sapins, près de chez moi, ainsi que dans un jardin de Serrières.

25 mai. ♂♀, forêt de conifères, près d'Anet.

Acrocephalus arundinacea, 112 — l'effarvatte.

22 mai. Nid avec 4 œufs, sur saule (le 31, la ♀ couve encore).

Acrocephalus turdoïde, 113 — la rousserolle.

16 mai. Première observation (Auvernier).

Sylvia cinerea, 123 — la fauvette grisette.

24 mai. Juv. envolés.

Sylvia atricapilla, 126 — la fauvette à tête noire.

7 mai. Dans un Thuya, nid avec 1 oeuf.

11 mai. 5 oeufs. Puis ♂ et ♀ couvent alternativement. Le 25 à midi, la ♀ recouvre ses juv. éclos.

20 mai. Dans un laurier-cerise, taillé en boule, nid 5 oeufs.

Merula vulgaris, 128 — le merle noir.

Mai. On trouve des juv. hors nid, d'autres bien emplumés encore dans le nid; de tout jeunes oiseaux venant d'éclore, des oeufs et des nids en construction.

Turdus viscivorus, 131 — la grive litorne.

18 mai. Chant: de 950 m. à 1363 m. (Creux du Van).

Turdus musicus, 132 — la grive musicienne.

23 mai. Juv. hors nid derrière la Mairesse (Colombier) et nid avec 5 oeufs, la ♀ couve encore le 30.

Ruticilla tithys, 137 — le rouge-queue.

18 mai. 5 ou 7 individus en livrée grise, à la Ferme Robert (981 m.). Nid avec 4 oeufs au Châlet du Lessy (1370 m.).

Derniers jours du mois, juv. hors du nid, un peu partout au Vignoble.

Cyanecula leucocyanea, 141 — la gorge bleue.

22 mai. Cris d'ad. et juv., Chânet de Boudry.

Dandalus rubecula, 142 — le rouge-gorge.

8 mai. Nid avec 7 oeufs, dans du lierre.

22 mai. Sont éclos et le 31 les 7 juv. sont encore dans le nid.

18 mai. Chant: de 850 m. à 1300 m. (Creux de Van).

Emberiza citrinella, 164 — le bruant jaune.

9 mai. Nid avec 4 oeufs, dans un Thuya.

Passer domesticus, 175 — le moineau.

21 mai. Observé les premiers juv.

Fringilla coelebs, 177 — le pinson.

12 mai. Accouplement d'une paire.

26 mai. Observé juv. hors nid.

Serinus hortulanus, 181 — le ceni.

10 mai. Nid avec 4 oeufs (Thuya).

12 mai. 3 juv., 1 oeuf clair; le 27, disparus.

Carduelis elegans, 184 — le chardonneret.

1^{er} mai. ♂♀ prennent des radicelles (jardin).

Cannabina sauguinea, 185 — la linotte.

12 mai. Nid avec 5 oeufs (Ilex), éclosion le 24.

Columba palumbus, 194 — le ramier.

14 mai. Observé 1 individu aux Allées; le 19, un couple. — Puis, chaque

jour un ou deux râmiers. L'espèce a peu de représentants dans notre région cette année.

Phasianus colchicus — le faisan commun.

18 mai. ♂ se promène aux Prés d'Areuse.

25 mai. ♂ près du Pont de la Directe (Marin).

Coturnix dactylisonans, 205 — la caille.

25 mai. Chant, Grand Marais.

Aegialites hiaticula, 217 — le gd. pluvier à collier.

25 mai. 2 individus, grèves de Witzwyl.

Vanellus cristatus, 219 — le vanneau.

25 mai. Une trentaine, devant Witzwyl.

Ardetta nimuta, 232 — le héron blongios.

Mi-mai. Nids avec oeufs (Vieille Thièle).

Gallinula chloropus, 240 — la poule d'eau.

20 mai. Quelques poussins se promènent dans une mare, à proximité de la ligne du Tram, au Creux des Grenouilles (Auvernier).

Numenius arquatus, 242 — le courlis cendré.

25 mai. Cri d'un individu vis-à-vis de Champion, puis un second, vole longtemps au-dessus de moi en poussant son cri spécial (Tourbières d'Anet).

Scolopax rusticola, 248 — la bécasse.

5 mai. M. Max Dupasquier, inspecteur-forestier, nous communique : Montagne Jacot (1100 m. altitude), commune de Rochefort, près Neuchâtel. Trouvé un nid avec 4 oeufs dans des repeuplements de sapins et d'épicéas, le sol et les sapineaux sont couverts de neige. Le lendemain, il y avait 15 cm. de neige. Que sera devenue cette couvée ?

18 mai. J'en lève une à 1263 m., avant le Pré aux Favres (Mont Boudry).

Totanus ochropus, 256.

7 mai. Soir 7 h. observé un individu près du Bied.

Anas boschas, 287 — le canard sauvage.

25 mai. Je lève devant Witzwyl, 8 ♂ et 3 ♀. — Aux Genévriers (Marin) 9 ♂ ; ils étaient couchés sur les roseaux secs amoncelés sur la rive. Je n'ai observé aucun juv. malgré que les roseaux soient encore peu élevés.

Fuligula cristata, 298 — le canard morillon.

19 janvier. Devant Champ-Bougin (Neuchâtel), groupe d'une douzaine.

28 janvier. Depuis une quinzaine de jours, je remarque un ♂ blessé, ne pouvant voler, il se tient des Riaux (Auv.) aux Bains de l'Evoile.

16 et 25 février. Devant embouchure de l'Areuse, 4 ♂ et 1 ♀.

21 février. Vol de 5 individus, Evoile.

27 février. Les morillons sont nombreux sur le lac.

25 février. Le capitaine d'un bateau, venant de Morat, affirme avoir vu après la sortie du canal de la Broye, au moins 2 à 3000 canards.

D'après nos informations particulières, ces palmipèdes étaient en effet fort nombreux depuis quelques jours; on remarquait principalement des canards sauvages ordinaires, puis des garrots, piletts, morillons et sareelles.

Mergus merganser, 308 — le grand harle.

21 février. 6 h. soir, Baie de l'Evole, ♂♀ volant.

30 mars. 2 ♂, Baie d'Auvernier.

18 avril. 4 h. soir, ♂♀ bord du lac (Grandverger).

7 mai. Soir 6 h. au Bied, observé 3 ♂ volant „en enfilade“ tout en poussant leurs „Körr Körr“ caractéristiques.

Podiceps cristatus, 314 — le grèbe huppé.

Avril. Chaque jour ♂♀, Baie d'Auvernier.

Podiceps rubricollis, 315 — le grèbe jou-gris.

4 mars. 1 ♂, Baie d'Auvernier.

Podiceps minor, 318 — le grèbe castagneux.

Janvier. Chaque jour, quelques individus près d'Auvernier dans roseaux coupés.

27 janvier. 1 castagneux sur l'Areuse, près Travers.

Février. Quelques individus régulièrement du Bas des Allées aux Ruaux.

6 mars. Dans roseaux coupés, 6 individus.

24, 26 mars. 2 individus, même station.

Xema ridibundum, 346 — la mouette rieuse.

Mai. Durant le mois je n'observe aucune rieuse.

Sterna caspia, 347 — la sterne Tschegrava.

1er au 12 avril. A plusieurs reprises on observe 2 ou 3 individus devant l'Evole (Vouga) et dans la baie d'Auvernier (Mathey-Dupraz).

Hydrochelidon nigra, 356 — la sterne épouvantail.

4 mai. Nombreuses au milieu du lac.

7 mai. Quelques-unes, embouchure de l'Areuse.


Le 13 mai entendu le toriot.

Le torcoi a été entendu plusieurs fois ce mois. La huppe une seule fois.

Le 29. avril, de nombreux martinets noirs à Payerne.

Le 3 mai, martinets noirs ont été vus à Orbe par Melle Magnin.

M. Moreillon, Montcherand.



Selten gewordene oder ganz verschwundene Vogelarten.

Mein nachfolgender Bericht bezieht sich auf das bernische Worblental und die angrenzenden Höhenzüge.

Ganz verschwunden ist der Kolkkrabe, der vor circa 40 Jahren noch in den Felsen des Lindentales horstete. Unter den Raubvögeln verschwand durch Abschuss auch der Uhu aus gleicher Gegend. Ganz selten ist auch der Baumfalke geworden. Den Rötelfalken habe ich noch vor ungefähr 30