



### Anomalie du plumage de la Guifette à ailes blanches

*Hydrochelidon leucoptera*, Sch.

Par R. Poncey, Genève.

Nous avons signalé<sup>1)</sup> la capture devant la Pointe à la Bise (Genève) le 28 mai 1916 de trois Guifettes leucoptères<sup>2)</sup> ♀ (vulg. Bezolets à ailes blanches) qui volaient au milieu d'un grand vol d'Épouvantails (*H. nigra*, BOÏE). L'une d'elles était, chose curieuse, encore en plumage d'hiver tandis qu'une autre avait son plumage de noces complet. La troisième (v. illustration) présentait un plumage que nous supposons tout d'abord être un état intermédiaire entre celui de ses deux compagnes. Cependant toutes les plumes étant parfaitement neuves et formées, sans tuyaux, aussi bien les blanches que les noires, ne s'agirait-il pas plutôt d'un commencement d'albinisme? Seule la première rémige sort du tuyau et est encore trop courte de 45 mm. chose extraordinaire pour l'époque.

Cet intéressant sujet, trop peu frais pour être naturalisé, est conservé en peau au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Les deux autres se trouvent dans la collection Vaucher.

<sup>1)</sup> Voir „Bull. Soc. zool. Genève,“ T. II, p. 186.

<sup>2)</sup> Hirondelle de mer leucoptère — Weissflüglige Seeschwalbe — Mignat-tion ali bianche.