

Kleinere Mitteilungen. Communications diverses.

Tragischer Tod einer Kohlmeisenmutter. Schon drei Jahre brütete ein Kohlmeisenpaar in einem Starenkasten, der am Kamin des Hinterhauses angebracht ist. Es war für mich und meine Familie immer eine Freude, die Alten eunig bei der Fütterung zu beobachten. Ganz besonders sehnten wir uns alle auf den Tag, wo die Jungen ihre Wiege verliessen. Ofters führten die Alten ihre Kinder bis dicht vor unser Fenster um das von uns ausgestreute Futter in Empfang zu nehmen. So geschah es eines Morgens in aller Frühe. Meine Frau pflegte Nachts über die Milchkanne auf der Terrasse niederzusetzen. Und nun geschah das Unglaubliche. Auf noch unaufgeklärte Weise war der Deckel entfernt, man hörte das Platschern, und Spritzer flogen an unser Fenster. Beim Nachsehen fand meine Frau eine der Kohlmeisen in der Milch ertrunken. Eine Rettung war nicht mehr möglich. Die nähere Prüfung ergab, das es die Mutter der siebenköpfigen Kohlmeisenfamilie war. Der Meisenvater schien das Unglück amfangs nicht gemerkt zu haben, nur die Jungen wollten nicht weichen, trotz unserer Anwesenheit auf der Terrasse.

Der Meisenvater kam mit Futter angeflogen und jetzt schien ihm das Fehlen seiner treuen Gefährtin gewahr zu werden, er zeigte sich etwas unruhig, flog aber dennoch davon, die Jungen blieben immer noch in unserer Nähe. Mit einer fetten Raupe im Schnabel kam er abernals angeflogen, hielt kurz ein und nun begann das Locken, erst „pink pink“, die Erregung stieg, das merkte man ihm gut an. Nun kamen die ärgerlich meckernden Laute. Zwischen hinein das „Zizi däda“. Das Suchen nach Futter wurde unterbrochen, trotz bitten der Jungen und noch den ganzen Morgen hörten wir all die verschiedenen Lockrufe des so plötzlich verwitweten Meisenvaters und der Waisenkinder. Für die so tragisch ums Leben gekommene Meisennutter fanden meine Kinder eine letzte Ruhestätte.

Ernst Sänger, Basel.

CHRONIK — CHRONIQUE.

Wir bitten um zahlreiche Mitteilungen betreffend den Herbstzug. Je mehr Daten um so besser!

Alcedo isspida L., Eisvogel. Ist bei Meggen am Vierwaldstättersee ziemlich zahlreich. Zirka 10 Stück beobachtet. P. Feer.

Ruticilla tithys L., Hausrotschwanz. Ist am 5. August auf Rauhflüberg die zweite Brut ausgeflogen. Chr. Hofstetter.

Carduelis elegans STEPH., Distelfink. Am 10. August bei Rauhflüe eine Brut Junge ausgeflogen. Chr. Hofstetter.

Bonasa betulina Scop., Haselhuhn. Am 15. Juni am Hörlti (Zürcher Oberland), ein Haselhuhn mit nur wenig Tagen alten Dunenjungen aufgeschreckt. Eines kam mir in die Hände; nach kurzer Besichtigung wurde es der lockenden Mutter zurückgegeben. C. Girtanner.

Coturnix communis, BONNAT., Wachtel. In der Nacht vom 29./30. Aug. während welcher ein Gewitter über der Stadt Bern losbrach, verunglückten einige ziehende Wachteln, d. h. es wurden solche am Morgen in den Strassen gefunden. A. Hess.

Umfrage.

Mauersegler, *Cypselus apus* L. Wir ersuchen um Bekanntgabe des diesjährigen Abzugsdatums aus möglichst vielen Orten. Dieselben sollen alle zusammengestellt werden.

Alpensegler, *Cypselus melba* L. Erwünscht wäre uns die Meldung der Ortschaften in unserem Lande, wo der Alpensegler dieses Jahr Brutvogel war.

Vom Bodensee.

Das denkbar schlechteste Frühlingswetter, welches wir dieses Jahr gehabt haben, liess erwarten, dass unter den früher ankommenden Zugvögeln eine merkliche Abnahme zu konstatieren sei. Dies ist dann auch bei den Drosseln, Lerchen, Staren und Hausrotschwänzen der Fall gewesen, aber bei weitem nicht in dem Masse, wie ich vermutete. (Sind wohl die Lücken durch Nachzügler ersetzt worden?) Denn der Massensterbet der ersten Aprillage entspricht gar nicht dem jetzigen Bestand. Nach meinen Erkundigungen sind in unserm Dörfchen fast alle Rauchschwalbenester bis auf einige Pärchen wieder bezogen worden. Die Stadtschwalbe, von der wir vor 20 Jahren noch kein einziges Nest im Dorfe hatten, sind es nun mindestens 30 Paare, die sich angesiedelt haben, das heisst, noch einige mehr als letztes Jahr.

Von den später ankommenden Zugvögeln erschienen in vermehrter Zahl der Graue Fliegenschäpper (der Schwarzstirnte fehlte dieses Jahr) ferner der Rotköpfige und Rotrückige Würger. Letzterer wählte sogar mangels an Hecken, schon zwei Jahre ein niedriger, dichtbelaubter Apfelbaum als Brutplatz. Den kleinen Grauen Würger habe ich seit 1908 nie mehr beobachtet, trotzdem er nicht sehr weit von hier regelmässiger Brutvogel ist. Die Wechtele ist ebenfalls in vermehrter Zahl erschienen, allerdings in bescheidenerem Masse.

Unter den Raubvögeln sind der Wespenbussard, Braune Gabelweih und Baumfaulk in normaler Weise eingetroffen, dagegen beobachtete ich den Roten Gabelweih nicht so häufig wie letztes Jahr. Die Zahl der Sperber ist ebenfalls im Rückgang.

Am 20. August stiess ein Wanderfalke zweimal auf einen Flug Star, musste aber leer abziehen.

A. Isler, Kaltenbach (Thurgau).

Observations ornithologiques, 1919.

A. Mathey-Dupraz, Colombier, N.

Milan noir. Juin et juillet, observations journalières: Baie d'Auvernier, Serrières, Evole, Baie du Petit Cortaillod, Chez le Bart; juillet 16, deux milans sur Yverdon; août 3, deux milans planent sur le Meggerhorn (Lucerne). — Cresserelle. Juillet 30, une criblette, champs de Couvet (Val de Travers), deux individus évoluent au-dessus du Falconnaire (1418 m.) au Creux du Van; août 27, une cresserelle posée, guette des moineaux picorant dans un champ de froment (Planeuse). — Busard ordinaire. Juillet et août, cris réguliers aux environs des Verrières; juillet 26, ad. et juv., région de Tablettes (1253 m.); août 26, même observation, rochers de Treymont et côtes de la Brûlée (900 à 1200 m.). — Chouette chevêche, un individu observé dans une sapinière, près du Locle (Matthey-Jeantet), les 13 et 14 juillet. — Martinet noir. Juillet 3, on m'apporte un juv. tombé du nid, pennes des ailes et de la queue à moitié de leur croissance; du 22 au 28, encore quelques individus (de 450 à 1000 m.), à Neuchâtel, Colombier, Travers et les Verrières; 30, vol d'une cinquantaine criant au-dessus des Verrières (7 h. 30 mat.), dans la journée du 29 l'on en avait aperçu aucune. Le 31, ils ont quitté la région du Vignoble. — Hirondelle de cheminée. Fin août encore quelques individus clairsemés. — Hirondelle de fenêtre. Août 27, grand rassemblement sur les fils électriques; 28 au 31, aucune observation. — Coucou. Observé un individu près de Trois Rods (Boudry); août 26, oiseau ♂ adulte gris-cendré. — Tourneau, juillet 12, observé un vol de quinze à la Mairesse (Colombier), cas rare chez nous à cette époque de l'été. — Cassenoix. Août 26, cris dans les côtes de Treymont, de la Brûlée, vers le Pré aux Favres, Crête de la Déracinée et Fontaine froide (Creux du Van). — Pie vert. Août 10, cris aux Râpes, sur les Verrières (1220 m.); 27, observé un individu chassant les sauterelles sur la Forêt (Boudry). — Sitelle torchepot. Août 24, un individu recueille des baies d'if (Bôle). — Huppe. Août 5, observé un individu au bas des Allées, peut-être un couple a-t-il niché dans la région. — Trorglo dyte. Juillet 30, entendu son chant, de la Grand'Vy (1382 m.) au Champ du Moulin et Gorges de la Reuse (621 à 538 m.) — Cinclète aquatique. Août 26,

trois cincles se jouent au vol le long de la Reuse, près des Molliats. — **Fauvette à tête noire.** Juillet 31, chant à Châteloz et le long du Merdasson (dernière observation). — **Merle noir,** chant dans nos environs jusqu'au 31 juillet; août 1^{er}, chant aux Allées. — **Traquet motteux.** Août, ad. et juv. aux Verrières. — **Traquet tarié,** id., champs des Verrières. — **Alouette lulu.** Juin 19, chant à la Grand'Vy (montagne du Creux du Van), 1400 m. environ; juillet 17, chant sur la Forêt, près Boudry, 520 m. — **Venturon.** Juin 19, un vol devant la Ferme du Grand'Vy. — **Linotte.** Mi-août, ad et juv. très nombreux aux environs des Verrières. — **Ramier.** De juin à fin août, observations régulières; août 24, quatre ramier à la Tourne (1131 m.), exceptionnellement un couple a niché aux abords de l'Hôtel. — **Grand Tétras.** Juin 14, un nid contenant 9 œufs entre Marmoud et les Voirins. Il est placé sous les branches d'un hêtre buissonnant; août 26, une belle poule pennichée au bord du chemin à Régis (Montagne de Boudry). — **Caillé.** Juin et juillet, quelques-unes dans la vallée du Locle (Matthey-Jeantet); juillet 17 au 31, cris au bas des Côtes, les Verrières. — **Cigogne blanche.** Juin 28, un couple de ces oiseaux s'arrête longuement sur la haute cheminée d'une usine, chemin des Mélèzes, à la Queue d'Arve (Genève). — **Râle de genêts.** Juin et juillet, cris de l'espèce, vallées du Locle et des Verrières. — **Poule d'eau ordinaire,** un couple a niché près des Bains des dames à Auvernier, dans la roselière; août 28, trois individus dans cet endroit. — **Foulque macroule.** Août 19 et 26, observé un couple avec quatre juv. en duvet de la grosseur d'un castagnous (dessous de la gorge, cou et poitrine gris-cendré clair, le reste noir); 28, Port d'Auvernier, une douzaine de judelets parmi les potamots. — **Chevalier cul-blanc.** Août 28, deux individus, Réserve de la Baie d'Auvernier; de mi-à fin-août un cul-blanc séjourne le long de la Reuse dans la région des Vannes, près Boudry. — **Canard sauvage.** Juin, juillet, un couple avec des canetons est aperçu dans la Réserve; août 19, trois maréches sur la Reuse, vis-à-vis de Rosières (Val de Travers), quelques groupes du Petit Cortaillod à Vaumarcus. — **Grand harle.** Une femelle a couvé dans une excavation d'un peuplier, puis après l'éclosion a conduit ses juv. à la Reuse. — **Grèbe huppé.** Fin août, très nombreuses d'Auvernier à Serrières, ad. et juv. — **Grèbe castagnoux.** Du 16 mai au 28 août aucune observation, à cette dernière date 8 grébiots près d'Auvernier. — **Mouette rieuse.** Du 12 au 31 mai aucune observation; en juin, un ou deux individus observés; juillet 17, 10 rieuses; le 21, 20 rieuses, môle d'Auvernier; vu devant Serrières une juv. 19 au vol; dès la mi-août sont nombreuses de Neuchâtel à Vaumarcus (principalement de Treytel à Chez le Bart), toutes ont la tête et la queue entièrement blanches; le 21 juillet, nous avons observé deux individus à tête brune.

Osservazioni sul ripasso primavera 1919 a Bellinzona ed a Compravasco (Blenio).

2 Febbrajo. Visto una quantità di corvi. — 3. I merli si accopiano. — 4. Visto alcune viscardie (*turdus viscivorus*). — 12. Visto una copia di cingalegre (*parus major*). — 26. Sulle piante di larici in giardino un centinago di lucherini (*Chrysomitris spinus*). — 1 marzo. Si sente il canto primaverile del fringuellino. — 4. Visto una zibiera (volo) di allodole. — 10-12. Forte ripasso d'ogni qualità di insettivori: pettirossi, codirossi, capinere etc., le calandre s'accoppiano (*Lenthus lainpestris*). — 21. Nevica, si vedono tanti uccelli, sopra tutto tordi e merli. — 22. Gran ripasso di tordi. — 22-24. Gran ripasso d'uccelletti. — 25. Osservato 5 stornelli ed un gran volo di fringuelli. — 27. Visto un altro volo di stornelli. — 7 aprile. Visto la prima rondine. — 13. Visto un volo di cardellini ed un volo di verdozzi, visto la seconda rondine. — 15. Giorno pioviginoso, ripasso, d'ogni sorta di insettivori, soprattutto becaccie, visto la terza rondine (*Rauchschiwalbe*). — 17. Arrivato alla nuova dimora in Comprovasco (Blenio) trovai un nido di merli con 4 piccoli già piumati, vari nidi di fringuelli, vidi però ancor uno sericciolo (*Troglodites parvulus*), un pettirosso e varie cingalegre. — 1 maggio. S'invola un nido di merlo. — 2 maggio. Ripasso di molte rondini. — 8. Visto i primi rondoni. — 11. Visto una quaglia. — 12. Una coppia di zufolotti fanno il nido. Sentito il canto del cunculo. — 18. Una coppia di cincie hanno il nido in un foro di muro.

R. Paganini.