

## OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES.

1<sup>er</sup> mai au 30 septembre 1932.

A. Mathey-Dupraz, Colombier (Neuch.).

*Milvus m. migrans Bodd.* — Printemps et commencement de l'été 1930, 1931 et 1932, un milan noir solitaire est observé le long du cours de la Reuse, du Grand Rorthier (p. Noiraigue) aux abattoirs de Fleurier (Alf. Martin, Travers). — 29 juillet, un individu devant Bellerive (Saint-Aubin). — 6 août, un milan noir devant l'embouchure de la Serrière.

*Buteo b. buteo L.* — 13 juillet, au-dessus des rochers des Tablettes (1236 m), sur Rochefort, groupe de 5 buses (2 et 3) survolant le plateau et la région des Lapples (près de la Tourne). Peut-être une famille? Même observation le 9 août, alors ce volier survolait en piaillant le haut de la Combe Léonard, sur Rochefort. — 28 août, à 1000 m environ, au-dessus de la Benette (Prises de Gorgier), passage de 5 ou 6 buses migratrices.

*Athene n. noctua Retz.* — Durant cette année aucune observation concernant la chouette chevêche, autrefois commune aux Allées de Colombier.

*Strix a. aluco L.* — Dès la mi-février, durant les nuits claires principalement, le cri de la chouette hulotte se laissait dans la futaie du Crêt Mouchet, à Colombier. Dans la matinée du 11 mai, deux corneilles harcelaient, aux Allées, un jeune chat-huant, qu'elles finirent par jeter à bas d'un arbre. Cet oiseau avait les ailes bien développées, ce qui lui permettait de voler à courte distance, la queue avait atteint la moitié de sa longueur normale; la tête, le cou, le dessus du corps, l'abdomen étaient couverts par des plumes-duvet. Ce poussin fut capturé par une personne qui me le confia. Il fut nourri de rate, de foie, d'escargots débarrassés de leur coquille et de temps à autre des souris, qu'il avalait tout entière, la tête en avant. Ce régime lui convenait, les plumes-duvet furent remplacées par des plumes roussâtres, ainsi que les grandes penes des ailes. Munie de l'anneau 6009 cette chouette fut relâchée dans la nuit du 26 au 27 juin, elle passa la journée du 27 juin, cachée dans un poirier de la propriété du Foulon, mais fut constamment harcelée par les petits oiseaux et les corneilles. A la tombée de la nuit la hulotte prit son envol.

*Apus a. apus L.* — 28 avril, à 18 h. 30, cris sur Colombier (1<sup>re</sup> observ.); 3 mai, à 19 h. 30 même remarque. Très peu de martinets noirs dans notre région en 1932. Juillet du 10 au 13, cris de jeunes hors du nid. Dans les soirées de juillet, du 14 au 20, entendu les cris de quelques individus. Dès le 21 juillet aucune observation.

*Hirundo r. rustica L.* — Dès les derniers jours de mars l'apparition de quelques individus était signalée dans le Vignoble neuchâtelois. Le 7 avril des hirondelles rustiques sont vues aux Bayards (1000 m) et le 8 elles apparaissent à Colombier (460 m), mais le gros des migratrices arrive dans la soirée du 23 avril. — Trois nids sont occupés, le 28 juillet, à l'Hôtel de la Tourne (1131 m). Ces oiseaux sont nombreux dans la vallée des Ponts, à Noiraigue, à Travers (29 juillet). A Gorgier, observé le 28 août, des juv. posés sur les fils aériens et nourris par leurs parents.

*Delichon urbica L.* — 3 mai, entendu les cris de 2 ou 3 individus, à Colombier. Le 11 mai, des milliers de chélidons viennent se poser sur les saillies de la façade de la maison de Montmollin, Place des Halles, à Neuchâtel; il pleut à verse depuis plusieurs jours. Ces migratrices seraient arrivées en 3 groupes successifs — 29 juillet, juv. au nid, à la Tourne-Dessus (1159 m) et à Gorgier (495 m), la Béroche. 11 sept., des centaines de culs-blancs sont rassemblés sur les fils aériens, dès avant 7 h., à Travers (732 m); même observation le lendemain, au Vignobel. Départ en masse de ces hirondelles, le 17 sept. (le lendemain violent orage dès 6 h. 30 du matin).

*Riparia r. riparia* L. — 28 avril, observé un seul ind., à la station de la groisière Loeffel, sur Boudry. — Même endroit : mi-mai, remarqué seulement 5 ou 6 couples nicheurs ; 28, aucune hirondelle de rivage, en vue.

*Cuculus c. canorus* L. — Un ami nous communique qu'il avait entendu, les premiers jours d'avril, les cris d'appel du coucou dans la Côte de Chaumont. — 1<sup>er</sup> mai, cris d'un mâle, dans les parages de la place de Golf, au-dessus de Neuchâtel. — Le 5, cris vers Champmartin et dans la forêt de Charmontel (Vully). — 29 mai, du Champ-du-Moulin au Pré des Clées (Gorge de la Reuse), je ne perçois aucun cri de coucou. 12 juillet, cris d'un mâle, à 1200 m, dans la Combe Léonard, sur Rochefort.

*Siurnus v. vulgaris* L. — En mai et juin, aucune observation de sanonnets dans nos parages. À la mi-juin cependant une famille d'étourneaux dépouille de ses fruits deux cerisiers printaniers. L'on m'apporte un jeune de l'année.

*Picus viridis virescens* Br. — 28 avril et 24 juillet, un pic vert grim pant le tronc d'un chêne, dans le Bois Loeffel, Val du Merdasson, sur Boudry.

*Dryobates major pinetorum* Br. — Commencement de mai, tambourinage d'un pic épeiche, aux Allées. 12 août, vers 1080 m, à la lisière de la forêt (Haut des Prises de Gorgier, la Béroche), cris d'un individu.

*Muscicapa st. striata* Pall. — 30 juin, cris de juv. hors du nid, Allées de Colombier.

*Troglodytes tr. troglodytes* L. — En août, on entend le joyeux chant de ce petit oiseau, dans nos forêts, de 500 à 1900 m.

*Cinclus c. aquaticus* Bechst. — Vers 16 h., le 29 mai, chant d'un cincle, vers le pont de la Verrière, aux Gorges de la Reuse.

*Parus m. major* L. — Dès le 3 juin, cris de mésangeaux dans les vergers de Colombier ; le 28, une famille, ad. et juv., aux Allées. — 16 septembre, les mésanges charbonnières ont repris leurs tournées erratiques journalières, l'on entend leurs cris de rappel. Elles affectionnent particulièrement les graines mûres du grand tournesol (*Helianthus annuus* L.).

*Phylloscopus s. sibilator* Bechst. — 15 mai, chant de plusieurs pouillots siffleurs, dans la pinède et la futaie des rives du lac, au Bas des Allées ; 10 août, cris d'appel de 450 m à 1150 m sur Chaumont.

*Ph. tr. trochilus* L. — 21 mai, chant d'un pouillot fitis à Porcena (Corcelles).

*Ph. c. collybita* Vieill. — 26 juin, un pouillot vélocé chante dans la pinède du Bas des Allées.

*Acrocephalus ar. arundinacea* L. — 3 mai, dans la roselière de la Baie d'Auvernier, chant de la rousserolle turdoïde.

*Sylvia c. curruca* L. — 22 avril, chant de la fauvette babillarde à Belle-rive (Saint-Aubin) ; 28, chant aux Rochettes (Boudry) ; 29, chant près de la Vigne Ronde, entre Colombier et Auvernier ; 13 juillet, chant dans la Combe Léonard, sur Rochefort.

*S. c. communis* L. (*cinerea* Lath.). — 29 avril, dans la haie de la Vigne Ronde, une fauvette grisette chante.

*S. at. atricapilla* L. — 17 mai, entendu le tāk-tāk d'une fauvette à tête noire dans mon jardin ; 24 juillet, chant au Bas des Allées ; 2 août, comme chaque année un individu visite, chaque jour, une ronce américaine ; mais aujourd'hui, les baies sont encore trop vertes.

*Turdus m. merula* L. — 4 mai, le merle tapiré (dont nous avons déjà parlé dans des notes précédentes, voir janvier 1931), élève 4 juv. de plumage normal ; le 10, les 4 juv. quittent le nid. — Du 1 au 20 juillet, chant d'un mâle ; 21, chant à Colombier ; 24 et 31, faible chant.

*T. ph. philomelos* Br. — Chant les 12, 15 et 25 mai, au Bas des Allées et vers le Bied ; 29, la grive musicienne chante aux Gorges de la Reuse, au

Pré des Clées, à Trois-Rods; 19 juin, chant dans les forêts, à l'envers, au-dessus de Travers.

*Phoenicurus ochrurus gibraltariensis* Gm. — L'espèce paraît disparue de nos parages à la suite des violents orages estivaux. Du commencement de juillet à fin de septembre nous n'avons entendu aucun cri d'oiseaux adultes ou de jeunes dans notre localité ou ses environs immédiats. — 22 septembre, chant d'un mâle titis, gare de Saint-Aubin.

*Ph. ph. phoenicurus* L. — Cet été l'espèce a été très rare dans la région, même cause que pour l'espèce précédente.

*Erithacus r. rubecula* L. — 13 juillet, chant de plusieurs individus, dans la Combe Léonard, sur Rochefort, de 850 à 1100 m.

*Motacilla a. alba* L. — Aucune observation de l'espèce, sur les rives de la Baie d'Auvernier, du 1 janvier au 30 septembre.

*Anthus sp. spinoletta* L. — 24 septembre, observé quelques pipits spioncelles sautillant sur les cailloux de la rive du lac, aux Ruaux, près d'Auvernier.

*A. tr. trivialis* L. — 19 juin. Chant d'un pipit des buissons à la Banderette et vers chez les Favre, sur Travers; puis, entre les Petites Fauconnières et le Soliat.

*Alauda ar. arvensis* L. — Commencement de mai, chant de quelques alouettes sur la Forêt, près Boudry. L'espèce est peu représentée cette année.

*Emberiza c. citrinella* L. — Entendu encore le chant de quelques bruants jaunes sur Planeyse, dans le Val du Merdasson, au-dessus de Rochefort, aux Prises de Gorgier, à la fin de juillet.

*Fringilla c. coelebs* L. — 8 juin, dans la soirée entendu les cris d'appel de juv., à l'avenue de la Gare, à Colombier. — Le 20 juillet, chant d'un pinson mâle aux Allées; le 21, même audition, au cimetière d'Auvernier; le 23 juillet, les pinsons chantaient encore des rives du lac au plateau des Tablettes (1255 m), sur la Tourne. Le 27 août, à la Place Purry (Neuchâtel) observé un couple nourrissant ses jeunes.

*Chloris ch. chloris* L. — Cette espèce se répand toujours davantage, surtout dans les jardins d'agrément plantés de conifères.

*Serinus canaria serinus* L. — 13 juillet, un mâle ceni chante dans le vieux cimetière de Bôle.

*Citrinella alpina* Scop. — 12 août, groupe de venturons, à 1452 m, dans les sapins, près de la Grand'Vy (montagne du Creux du Van) et à la limite de la pâture de la Baronne, à l'O. vers 1370 m environ.

*Carduelis c. carduelis* L. — 12, 13 juillet, chant dans les vergers à Bôle; 12 août, chant du chardonneret à Combamare et dans les jardins de Gorgier.

*Columba p. palumbus* L. — Le 24 septembre, un chasseur aperçoit, dans un chêne, deux ramiers sautillant de branche en branche, il en tire un. Ce ramier, un juv. de seconde couvée probablement, puisqu'il avait encore du duvet parmi les plumes de la tête.

*Tetrastes bonasia rupestris* Br. — Mi-juin, à l'Endroit, environs de Travers, une poule gélinotte accompagnée de 12 poussins en duvet (Alf. Martin, Travers). — Juillet et août, on signale aux abords de la Tourne, parmi les noisetiers, quelques familles de gélinottes.

*Vanellus vanellus* L. — 16 septembre, un groupe de 5 vanneaux stationne aux Prés de Reuse, 2 sont tirés par un chasseur. C'étaient des juv. de l'année; 26, un vanneau solitaire au même endroit.

*Ciconia c. ciconia* L. — 7 août, à 7 h., passent sur le Locle 100 à 150 cigognes blanches, direction du vol sud-est. — 14 août, dans la soirée 2 cigognes survolent Auvernier et Colombier, dir. sud-est.

*Ardea c. cinerea* L. — À la mi-mars des hérons cendrés avaient été signalés dans les goules de Font, près d'Estavayer. Le 26 juin, depuis le pont du bateau «Yverdon», à 19 h., à la hauteur de l'embouchure de la Reuse et du Grand Verger, les passagers observent au vol 4 hérons, puis un cin-

quième volant isolément près de la surface de l'eau, en ce moment très calme. Ces palmipèdes paraissent se diriger vers le Seeland.

*Fulica a. atra* L. — 3 ou 4 couples de foulques macroules ont niché dans les roseaux phragmites de la Baie d'Auvernier. Observé le 16 septembre, une foulque avec 4 jeunes, à mi-grosneur, dans la prairie de potamogetons (potamots), devant les Ruaux, vers Auvernier.

*Scelopax r. rusticola* L. — Chaque été, à la tombée de la nuit, on voit sortir du Bois des Lapples (sur la Tourne), une ou deux bécasses. Ces «Dames» au long-bec, passent au vol, par-dessus le toit de l'Hôtel de la Tourne, pour aller verminer dans les pâturages voisins. Ce sont des «bécasses nicheuses». A fin août, on a trouvé dans les prés du Chalet des Lapples une bécasse morte ayant l'aile brisée. A quoi attribuer cet accident? Coup de vent ou coup de feu?

*Anas plat. platyrhyncha* L. — 26 juin, entre Concise et Estavayer j'observe 4 canetons ne pouvant pas encore prendre leur envol. Fin juillet, même endroit, groupe de 10 canetons, ne pouvant pas encore voler. Août 8, même région, observé un groupe de 9 canetons, puis un autre de 10, ces jeunes palmipèdes s'envolent; 12, devant la Pologne (Béroche) un de 6 et un second de 8, ces canetons volent bien.

*Mergus m. merganser* L. — 20 mai, on m'apporte une femelle tirée près du Grand Verger, cet oiseau couvait. Quelques couples ont niché dans les parages de l'embouchure de la Reuse.

*Podiceps cr. cristatus* L. — De nombreux couples ont niché dans les phragmitées.

*P. r. ruficollis* Pall. Le grèbe castagneux paraît avoir disparu de notre région.

*Carbo cormoranus* MW. — Aucune observation (1<sup>er</sup> janvier — 30 sept.).

*Larus r. ridibundus* L. — Mai 11 à 17, aucune mouette rieuse en vue, d'Auvernier à la Baie de l'Évole. Juin 12, entrée du Canal de la Broye, matin 9.30 et soir 18 h., observé un vol d'une vingtaine de gueux. Juin 26 et 27, durant le trajet Auvernier, Embouchure de la Reuse, Petit-Cortailod, Chez-le-Bart, Estavayer, Concise, Grandson, Yverdon et même route pour le retour, je n'ai observé aucune rieuse. — Juillet 28, 2 mouettes devant Chez-le-Bart; le lendemain, une vingtaine sont posées sur le garde-fou du débarcadère de Chez-le-Bart; le 7 août, je compte une centaine de ces Laridés. — 24 septembre, observé près de l'embouchure de la Serrière, posées sur les cailloux de la rive, 3 rieuses, juv. de l'année: dessus de la tête brun-grisâtre, sur le dos mouchetures brunes, queue barrée brun-noir à l'extrémité des plumes. Bec jaunâtre, pointe noire (1 observation de la saison).

*Redaktion:*

Ernst Hänni, Bern, Spitalgasse 26; Prof. A. Mathey-Dupraz à Colombier.

*Redaktionskommission:*

Dr. A. Masarey; Dr. L. Pittet; A. Schifferli; Dr. J. Troller.

Alle Zuschriften an die ALA Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz und zu Händen der Redaktion sind zu richten an die Geschäftsstelle der ALA, Spitalgasse 26, Bern.

Druck und Expedition: E. Flück & Cie., Bern