

et la Protection des Oiseaux; G. van Muyden, als Vertreter der Union Romande des Sociétés Protectrices des Animaux, und A. Schifferli, Leiter der schweizerischen Vogelwarte Sempach.

Möge unserem Landeskomitee künftig mehr Zeit zur Behandlung schweizerischer Vogelschutzangelegenheiten zur Verfügung stehen und möge seine Arbeit stets von Erfolg gekrönt sein! Das sind die Wünsche, die ich am Schlusse des Berichtes noch anbringen möchte.

Zürich, im April 1938.

sig. Dr. W. Knopfli.

Région de Genève.

Vers le 20 novembre 1937, un certain nombre de *Grands Cormorans* se sont dispersés le long de la côte savoyarde du Léman. Un individu immature qui, après avoir pêché, se reposait les ailes entr'ouvertes sur un bloc émergeant de l'eau aux carrières de Meillerie, fut tiré et envoyé au musée de Thonon; il pesait près de trois kilogs; c'est la première fois qu'on observe l'espèce en cet endroit. Quatre autres individus se posèrent sur un peuplier près de Nernier et le cadavre de l'un d'eux fut trouvé à l'état de décomposition quelque temps plus tard sur la grève. Un second fut tiré sur un bloc erratique près des roseaux de Thougues où il se tenait avec les ailes à demi-ouvertes.

Le 20 décembre à 8 heures par temps de brouillard, un *Harle bièvre* probablement en migration est tiré par un pêcheur au moment où il passe au vol au-dessus du bateau de ce dernier. Il pèse 1 kilog. 760 gr. et a sur la tête un parasite mallophage *Trinoton luridum* Nitzsch; son intestin est complètement obstrué sur le tiers de sa longueur, c'est-à-dire sur 60 cent. par une colonie pesant 50 grammes composée de Vers cestodes pseudo-phylidiens dont l'un ne mesure pas moins de 90 cm. de longueur. Cet oiseau a l'estomac absolument vide.

Les grandes bandes de *Fuligules morillon* signalées en novembre¹⁾ se sont dispersées et ont été remplacées dans la deuxième semaine de décembre par d'assez nombreux mâles adultes. A noter aussi à la même époque dans la rade de Genève la présence de 3 m. et 4 fem. de *Canard Col-vert*, 2 m. de *Sarcelle d'hiver*, 4 *Canards Garrot* dont un m. ad., une *Foulque macroule* avec les scapulaires blanches, deux ou trois *Goelands cendrés* juv. et ad.; cette dernière espèce peu abondante cet hiver.

La *Mouette rieuse à bec croisé*²⁾ est venue jusqu'au 20 mars 1938 prendre le pain que je lui préparais sur la fenêtre. Les premières traces de son capuchon sont apparues le 6 mars et au bout de quinze jours il était complet sauf quelques petites plumes blanches à la base du bec. Durant toute cette période le soleil avait brillé durant onze heures par jour et le plumage de cet oiseau était de ce fait propre et en ordre³⁾. Son bec et ses pattes étaient d'un beau carmin foncé.

Le 1^{er} août 1937 à 8 h. ½ par épais brouillard, au col du glacier des Grands à l'altitude de 3000 m. (frontière franco-suisse) plusieurs couples de *Pinsons des neiges* picorent les «puces des glaciers» (Boreus?) abondantes sur la neige du névé. Au commencement d'octobre 1937, un mâle adulte de *Grand coq de bruyère* est capturé sur une montagne des environs des Gets en Haute-Savoie où les deux années précédentes deux autres sujets m. et fem. avaient été successivement tirés. Le 23 janvier 1938 un *Geai glandivore* a l'estomac rempli par trois grammes de glands de Chêne parmi lesquels se trouvent dix larves apodes entières de 14 mm. de long, probablement d'un coléoptère curculionide parasite des glands, le *Balaninus tessellatus* Desbr.

R. Poncy.

¹⁾ O. B. no. 6, 1938, p. 93.

²⁾ Idem.

³⁾ En ce qui concerne l'influence de la lumière comme stimulant voir: Binet, Prof. Léon — «La visite d'un Pigeonnier» in Rev. des deux Mondes 1^{er} janvier 1938, p. 214.