


La Mouette mélanocéphale sur le Lac Léman.

Par Paul Géroüdet, Genève

I. Nouvelle observation

Les 12 et 14 août 1946, je pus observer dans d'excellentes conditions trois jeunes Mouettes mélanocéphales *Larus m. melanocephalus*, Temminck 1820, qui séjournaient dans la rade de Genève.

Comme c'était mon premier passage à cet endroit, après plus d'un mois d'absence, il est probable qu'elles étaient déjà là auparavant; par la suite, je n'en vis plus trois ensemble, mais une seule, les 15, 17 et 25 août — cette dernière fois non plus dans la rade, mais devant Ruth, passant au vol en direction de la ville.



Une jeune Mouette mélanocéphale, *Larus m. melanocephalus* Temm., dessinée par R. Hainard au Port de Genève, le 16 déc. 1936. Le plumage juvénile a déjà mué partiellement à la tête et au dos; la racine du bec est devenue gris foncé.

(Cliché Nos Oiseaux 1937)

Les trois individus observés portaient le plumage juvénile, assez sombre en comparaison de celui qui j'avais noté en novembre 1936: tête et cou nuancés de brun-cendré clair, à des degrés divers chez chacun d'eux; petite tache brúnatre au-dessous de l'œil, et un bandeau occipital assez vague allant d'un œil à l'autre; manteau brun avec lisérés blanchâtres variant d'étendue d'un individu à l'autre; dessous blanc; queue barrée; les ailes offrant l'aspect bien connu d'après plusieurs dessins (R. Poncy 1935 - P. Géroüdet 1946). Le bec, dont la face frappait au premier coup d'œil, était entièrement noir, jusqu'à la base. Quant aux pattes, leur couleur était un *brun-olivâtre*,

avec une nuance rosâtre en plein soleil; mais vues de loin ou au vol, elles semblaient noires, comme je l'ai déjà écrit ailleurs (P. Géroüdet 1946).

Les Pierres du Niton étaient leur poste favori; elles y occupaient d'habitude le point le plus élevé, que leurs voisines les Mouettes rieuses leur cédaient sans contestation. Pas plus farouches que celles-ci, elles ne prêtaient aucune attention aux bateaux passant à proximité, ou s'envolaient en même temps lorsqu'une Corneille noire venait se poser sur la Pierre. Je pus observer qu'elles se baignaient au même moment que les Rieuses, mais que l'opération durait plus longtemps, de même que les soins donnés au plumage. Les Mélanocéphales se mêlaient librement aux Rieuses, tout en gardant une

visible indépendance, qu'on remarquait surtout au vol. Je vis l'une d'elles poursuivre une Rieuse tenant en son bec un morceau de pain, puis elle se mêla au groupe qui attendait sur l'eau, à quelques mètres du quai, une problématique nourriture; là, elle se mit à s'acharner du bec sur un croûton sec qui flottait, et que ses voisines n'osaient lui disputer. Elle se comportait donc exactement comme les Goélands cendrés qu'on observe en hiver. Comme eux aussi, les Mélanocéphales apparaissaient très irrégulièrement au Port, n'y restaient pas toute la journée en tout cas: sans doute vagabondaient-elles la plupart du temps le long des rives du lac. Je n'ai pu entendre le cri qu'une seule fois: un *kaekæk* assez bas. Telles sont les observations qui je pus faire.

II. Sur le Lac Léman

Il peut être intéressant de réunir toutes les dates que nous possédons sur l'apparition de cette espèce rare dans le bassin du Léman; dates dispersées dans diverses publications, et dont plusieurs figurent dans des notes de R. Poncy 1929, 1935.

— oct. 1848	un jeune	Genève	Fatio (1904) ¹⁾
15. sept. 1865	un jeune	Genève	Fatio (1904), Poncy (1929)
— sept. 1866	un adulte	Léman	» » » »
— mai 1892	un adulte	Léman	» » » »
9 mai 1897	un adulte	Messery (H ^{te} S.)	» » » »
6 oct. 1927	un jeune	Genève	Poncy (1929, 1935)
23 avril 1928	un jeune	Genève	» » »
29 sept. au			
7 nov. 1928	un jeune	Genève	» » »
27 août au			
13 sept. 1930	deux jeunes	Genève	Poncy (1930, 1935)
22 au 30 sept. 1931	un jeune	Genève	Poncy (1932, 1935)
21 nov. au			
19 déc. 1936	un jeune	Genève	Géroutet (1937)
27 mars 1937	un adulte	Vidy	in litt. A. Rothé
14 sept. 1937	un jeune	Genève	Richard (1937)
20 oct. 1937	un jeune	Genève	(obs. pers. P. Géroutet)
14 mai 1938	un jeune	Evian (H ^{te} S.)	Poncy (1939)
27 nov. 1938	un jeune	Genève	Géroutet (1938)
12 au 25 août 1946	De un à trois jeunes	Genève	(obs. pers. P. Géroutet)

¹⁾ L'exemplaire en question, que V. Fatio, non sans hésitations, nomma *Larus atricillus*, est bien un *melanocephalus* jeune. Il est presque exactement pareil à ceux que j'ai observés en août 1946. Cet oiseau figure dans la Collection locale du Musée Eynard, à Genève.

Il ressort de ce tableau que la Mouette mélanocéphale a été signalée 12 fois sur le lac pendant les 20 dernières années; il est possible d'ailleurs que deux ou trois dates concernent le même individu (1937—1938).

A l'exception d'un seul, tous les individus d'automne sont des jeunes. Les adultes se reconnaissent facilement au printemps, grâce

à leur capuchon noir, mais, en automne et en hiver, ils pourraient passer inaperçus parmi les Mouettes rieuses.

Les places de ponte les plus proches sont situées en Grèce et en Dobroudja; on n'a pas confirmation de celles d'Espagne et du Maroc mentionnées comme possibles par *Hartert* (1912—1938). Il peut donc paraître surprenant que de jeunes oiseaux de l'année se montrent en Suisse en juillet déjà, comme ceux de Bâle, ou en août. En Vendée, les premières Mélanocéphales sont aussi signalées à fin juillet et en août, selon L. Bureau (*N. Mayaud*, 1939), Bien qu'on n'en ait aucune preuve, il est vraisemblable que ces oiseaux, pour arriver sur le Léman, remontent la vallée du Rhône, peut-être en compagnie de Mouettes rieuses; le baguement a montré en effet que de jeunes Rieuses nées en Camargue se dirigent parfois vers le nord — l'une d'elles fut observée à Genève. En tout cas, l'ampleur des déplacements erratiques des jeunes Mélanocéphales est remarquable.

La Mouette mélanocéphale est extrêmement rare en Suisse, en dehors du Léman. *Corti* (1946) cite deux captures sur les lacs du Tessin. *Fatio* rapporte qu'elle a été trouvée sur le lac de Neuchâtel et près de Delémont; il faudrait pouvoir vérifier l'authenticité de ces anciennes données. Enfin il y a l'observation toute récente de Bâle. C'est tout, à ma connaissance.

Bibliographie

- Corti* U. A. (1945): Die Vögel des Kantons Tessin. Sonderabdr. aus dem Boll. soc. tic. sci. nat. 39, 97—98.
- Fatio* V. (1904): Faune des Vertébrés de la Suisse. Oiseaux II, 1515. Genève et Bâle.
- Géroudet* P. (1937): Calendrier ornith. Nos Oiseaux 13, 184.
 — (1938): Calendrier ornith. Nos Oiseaux 15, 24.
 — (1946): Les Palmipèdes 35 et 46—48. Neuchâtel et Paris.
- Hartert* E. (1912—38): Die Vögel der paläarktischen Fauna. Bd. 2, 1741. Ergänzungsband, 500.
- Mayaud* N. (1939): Commentaires sur l'Ornith. française. *Alauda* 11, 239.
- Poncy* R. (1929): La Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* Temminck à Genève. Bull. Soc. Zool. Genève 4, 67.
 — (1931): Extrait du *Journal de l'Observatoire ornith.* du port de Genève (1930). *Alauda* 3, 169.
 — (1932): Extrait du *Journal de l'Observatoire ornith.* du port de Genève (1931). *Alauda* 4, 196.
 — (1935): Note sur les oiseaux qui se sont montrés sur la petite jetée du Port de Genève. Arch. suisse d'Orn. 1, 240 (croquis).
 — (1939): Notes ornith. prises dans la région de Genève. Orn. Beob. 36, 112.
- Richard* A. (1937): Calendrier ornith. Nos Oiseaux 14, 74.