

947.947	○	5.10.67	Ullmatt, Lauwil/BL (Pfirter)	
	+	24.10.67	Le Moutoux par Champagnele: 46.44N/5.55E (Jura) France	150 km WSW
947.962*	○	9.10.67	Ullmatt, Lauwil/BL (Pfirter)	
	+	29.10.67	Pleure: 46.55N/5.27E (Jura) France	180 km WSW
947.937*	○	27. 9.67	Ullmatt, Lauwil/BL (Pfirter)	
	+	11.11.67	Montagne: 45.09N/5.12E (Isère) France	320 km SW
944.081*	○	zw. 1.1.- 31. 5.65	vermutl. Bremgarten/BE (Rychner)	
	+	12.11.67	Saint-André-de-Boège: 46.12N/6.24E (Hte-Savoie) France	115 km SW
944.172*	○ ad.	3. 7.66	Romont/BE (Benoit)	
	+	(20.11.67)	Mont Revard: 45.40N/5.59E bei Chambéry (Savoie) France	200 km SSW
947.979*	○	19.10.67	Ullmatt, Lauwil/BL (Pfirter)	
	+	26.11.67	Vitreux: 47.15N/5.41E (Jura) France	150 km W
944.477*	○	1.10.67	Gleiterspitz, Schänis/SG (Müller)	
	+	28. 4.68	Korbsee, Kreis Marktoberdorf: 47.47N/10.37E (Bayern) Deutschland	130 km ENE

Tannenhäher — *Nucifraga coryocatactes*

943.899	○	29. 9.68	Chasseral, Nods/BE (Benoit)	
	+	13.10.68	Combovin: 44.52N/5.05E (Drôme) France	290 km SW

Dohle — *Corvus monedula*

946.885*	○ dj.	4. 9.66	Aarau/AG (Pflegl.) (Mattenberger)	
	×	(15. 1.67)	Albon: 45.14N/4.52E (Drôme) France	345 km SW

BERICHTIGUNGEN

Berichtigungen zu früheren Ringfundmeldungen finden sich jeweils am Schluss der folgenden Abschnitte:

Mäusebussard <i>Buteo buteo</i> (S. 195)	Lachmöwe <i>Larus ridibundus</i> (S. 202)
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i> (S. 197)	Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i> (S. 211)

Zu unserer Ringfundmeldung für 1957 und 1958 ist ferner zu berichtigen (Orn. Beob. 56/1959, S. 158): Purpurreiher — *Ardea purpurea* (nicht *cinerea*)

Höchstalter schweizerischer Ringvögel, 3. Nachtrag

von URS N. GLUTZ VON BLOTZHEIM, Sempach

Vorgänge zu dieser Publikation finden sich im Orn. Beob. 61/1964: 106—127, 62/1965: 170—173 und 64/1967: 198—202.

Wie im 2. Nachtrag werden auch hier nur solche Vögel aufgeführt, die ein höheres Alter erreicht haben als der bisher als zweitältester publizierte Ringvogel. Kurzkomentare orientieren wiederum über bereits publizierte ältere Ringvögel; fehlt ein solcher Hinweis, dann handelt es sich um die bisher ältesten Schweizer Ringvögel der betreffenden Art. Wie in früheren Zusammenstellungen wird auch hier wieder auf Ringfunde verwiesen, die sich in diesem Zusammenhang nicht auswerten lassen (Habicht *Accipiter gentilis*, Steinkauz *Athene noctua*, Kohlmeise *Parus major* und Kolkrabe *Corvus corax*).

Beachtenswert sind in diesem Nachtrag vor allem die für Reiherente *Aythya fuligula*, Amsel *Turdus merula*, Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*, Rohrammer *Emberiza schoeniclus*, Bergfink *Fringilla montifringilla*, Kernbeisser *Coccothraustes coccothraustes* und Rabenkrähe *Corvus corone* ermittelten Höchstalter; unse-

res Wissens liegen die von ausländischen Beringungszentralen publizierten Höchstalter etwa gleich oder unter unseren Angaben. Für alle anderen Arten sind dagegen wesentlich ältere Vögel bekannt geworden oder dann geben auch die von uns ermittelten Höchstalter noch lange nicht die Werte, die für die betreffenden Arten zu erwarten sind (z. B. Grünspecht *Picus viridis* und Kleinspecht *Dendrocopos minor*).

Es werden dieselben Signaturen und Abkürzungen wie in den vorausgegangenen Publikationen verwendet. Die Zahlen in der Kolonne rechts geben das Intervall zwischen Beringungs- und Wiederfunddatum in Jahren, Monaten und Tagen an. Unter der Zahl der Wiederfunde verstehen wir die Zahl der durch den Beringer selbst kontrollierten oder durch Dritte wiedergefundenen Exemplare (gleichgültig ob nur einmal oder mehrmals kontrolliert). Diese Angabe gestattet in etwa abzuschätzen, ob durch die künftige Beringungstätigkeit wesentlich höhere Alter erwartet werden dürfen oder nicht. Wenn für eine Art mehr als 500 Wiederfunde vorliegen, wird auf eine diesbezügliche Angabe verzichtet.

Haubentaucher — *Podiceps cristatus* 108 Wiederfunde
 850.164* ○ nfl. 12. 7.58 Oberkirch/LU (Hofer)
 × 6. 4.68 Sempach/LU 9. 8. 25
 Daten des zweitältesten Haubentauchers bei GLUTZ (1964).

Zwergtaucher — *Podiceps ruficollis* 221 Wiederfunde
 929.838* ○ 14.11.54 Noville/VD (Baumann)
 944.618* () 22.12.63 Noville/VD (Baumann)
 K 007 () 10.12.67 Noville/VD (Baumann) 13. 0. 26
 Daten des zweitältesten Ringvogels bei GLUTZ (1967).

Stockente — *Anas platyrhynchos*
 804.960* ○ juv. 9. 6.54 Solothurn/SO (Bloesch) 12. 9. 28
 × 7. 4.67 Lohn/SO
 Der älteste Schweizer Ringvogel trug seinen Ring während 13 Jahren, 2 Monaten und 23 Tagen (GLUTZ 1965).

Reiherente — *Aythya fuligula* 39 Wiederfunde
 956.459* ○ ♂ ad. 18. 2.54 Luzern/LU (Burkhard)
 + 6. 5.66 Tschuchloma: 58.45N/42.41E (Kostroma) USSR 12. 2. 18
 808.331* ○ ♀ 24. 2.61 Luzern/LU (Benz)
 Z 6.715 () 27. 2.68 Luzern/LU (Schwab) 7. 0. 3

Habicht — *Accipiter gentilis* 25 Wiederfunde
 820.048* ○ ad. 17. 6.63 Sempach/LU (Vogelwarte)
 × 8. 8.68 Neuenkirch/LU ?
 Da im Wald nur der Ring an einem Knochen gefunden wurde, muss das Alter als unbekannt betrachtet werden.

Teichhuhn — *Gallinula chloropus* 57 Wiederfunde
 942.239 ○ dj. 26. 9.63 Oberkirch/LU (Hofer)
 c 25. 8.67 Oberkirch/LU (Hofer) 3. 11. 0
 Ältester Schweizer Ringvogel: ca. 8 Jahre und 3 Monate (GLUTZ 1964).

Bekassine — *Gallinago gallinago* 77 Wiederfunde
 699.956* ○ 18. 3.61 Neunkirch/SH (Wanner)
 + 0.12.66 Dun-sur-Auron: 46.53N/2.34E (Cher) France mind. 5. 8. 12
 Daten des zweitältesten Vogels bei GLUTZ (1967).

Waldwasserläufer — *Tringa ochropus* 8 Wiederfunde
 S 72.511* ○ 11. 8.66 Chavornay/VD (Glavyre)
 + 23. 3.68 Viareggio: 43.53N/10.16E (Lucca) Italien 1. 7. 12

- Bruchwasserläufer** — *Tringa glareola* 119 Wiederfunde
 691.626 ○ ad. 15. 5.66 Chavornay/VD (Vuagniaux)
 c 4. 5.68 Chavornay/VD (Glarey) 1. 11. 19
 S 66.715* ○ 15. 8.66 Egelsee, Gachnang/TG (Frei)
 + 17.10.67 Porto Tolle: 44.56N/12.19E (Rovigo) Italien 1. 2. 3
- Grünschenkel** — *Tringa nebularia* 6 Wiederfunde
 942.362* ○ 27. 8.62 Sempach/LU (Fuchs)
 2 Z 82.712 () 12. 5.67 Beerse: 51.19N/4.52E (Antwerpen) Belgien mind. 4. 8. 15
- Ringeltaube** — *Columba palumbus* 35 Wiederfunde
 945.275* ○ nj. 29. 6.64 Missy/VD (Blanc)
 + 8.10.67 Foix: 42.50N/1.35E (Ariège) France 3. 3. 9
 Die älteste Ringeltaube trug ihren Ring 4 Jahre, 4 Monate und 21 Tage (GLUTZ 1967).
- Steinkauz** — *Athene noctua* 142 Wiederfunde
 932.160* ○ nj. 19. 6.60 Granges-près-Marnand/VD (Nicod)
 × 11. 5.68 Dompierre/VD ?
 Es ist lediglich der Ring ohne Kadaver gefunden worden. Das erreichte Alter ist deshalb unbekannt. Älteste Ringvögel bei GLUTZ (1964).
- Wiedehopf** — *Upupa epops* 32 Wiederfunde
 723.197 ○ nj. 14. 6.64 Missy/VD (Blanc)
 c 2. 9.67 San Fernando: 36.28N/6.12W (Cadiz) Spanien 3. 2. 19
 Ältester Ringvogel siehe GLUTZ (1964).
- Grünspecht** — *Picus viridis* 15 Wiederfunde
 941.650* ○ ♀ 18.10.64 Hermrigen/BE (Siegenthaler)
 × 31. 8.68 Hermrigen/BE (Marbot) 3. 10. 13
 Daten des zweitältesten Vogels bei GLUTZ (1967).
- Kleinspecht** — *Dendrocopos minor* 6 Wiederfunde
 E 188.038 ○ ♂ ad. 26. 9.64 La Corbière/FR (Blanc)
 c 12. 7.67 Chevroux/VD (Blanc) 2. 9. 16
 292.016 ○ ♀ ad. 13. 8.67 La Corbière/FR (Blanc)
 c 29. 9.68 La Corbière/FR (Blanc) 1. 1. 16
- Uferschwalbe** — *Riparia riparia* 469 Wiederfunde
 E 86.603* ○ dj. 3. 7.63 Prangins/VD (Meylan)
 c 4. 8.67 Chens: 46.20N/6.16E (Hte-Savoie) France 4. 1. 1
 Auch der zweitälteste Ringvogel wurde mindestens 4-jährig (GLUTZ 1964).
- Wiesenpieper** — *Anthus pratensis* 16 Wiederfunde
 E 141.160* ○ dj. 4.10.64 Col de Bretolet/VS (Vogelwarte)
 + 10. 9.66 Staraja Russa: 57.59N/31.22E (Novgorod) USSR 1. 11. 6
 Der älteste Wiesenpieper trug seinen Ring 2 Jahre und 18 Tage (GLUTZ 1967).
- Heckenbraunelle** — *Prunella modularis* 116 Wiederfunde
 599.244 ○ vj. 8. 3.61 Pfaffnau/LU (Haller)
 × 0. 2.68 Alaigne: 43.07N/2.06E (Aude) France ca. 6. 11. 0
 E 191.373 ○ 28. 6.65 Vechigen/BE (Howald)
 c 27. 6.68 Vechigen/BE (Howald) 2. 11. 30
- Steinschmätzer** — *Oenanthe oenanthe* 5 Wiederfunde
 E 197.321* ○ dj. 16. 9.65 Col de Bretolet/VS (Vogelwarte)
 × 1. 7.67 Sibo: 61.13N/16.36E Hanebo (Hälsingland) Schweden 1. 9. 15
 Daten des zweitältesten Steinschmätzers bei GLUTZ (1965).
- Amsel** — *Turdus merula*
 655.949* ○ dj. 23. 6.54 Lyss/BE (Niggeler)
 × 22.12.67 Lyss/BE 13. 5. 29
 611.633* ○ nj. 28. 6.58 Lyss/BE (Ris)
 × ca. 18. 3.68 Lyss/BE ca. 9. 8. 18

- Singdrossel** — *Turdus philomelos* 370 Wiederfunde
 694.675* ○ ad. 1.10.61 Neunforn/TG (Frei)
 + 3.12.67 Marsciano: 42.54N/12.19E (Perugia) Italien 6. 2. 2
 Die bisher älteste Singdrossel trug ihren Ring während 5 Jahren und 4 Tagen
 (GLUTZ 1964).
- Misteldrossel** — *Turdus viscivorus* 29 Wiederfunde
 731.313 ○ dj. 29. 9.64 Gleiterspitz, Schänis/SG (Müller)
 + (2. 3.67) Marseille: 43.18N/5.24E (Bouches-du-Rhône) France (2. 5. 2)
 Vgl. auch GLUTZ (1964).
- Mönchsgrasmücke** — *Sylvia atricapilla* 384 Wiederfunde
 E 6.562* ○ nj. 20. 5.61 Ascona/TI (Teichert)
 × 24. 4.67 Ascona/TI 5. 11. 4
 Der bisher älteste Ringvogel trug seinen Ring während mindestens 4 Jahren,
 10 Monaten und 16 Tagen (GLUTZ 1964).
- Weidenmeise, Alpenmeise** *Parus montanus* 91 Wiederfunde
 E 237.172 ○ 2.10.65 Bavois/VD (Glayre)
 c 29. 9.68 Bavois/VD (Magnenat) 2. 11. 27
 Die älteste Weidenmeise trug ihren Ring während 3 Jahren, 5 Monaten und
 27 Tagen (GLUTZ 1965).
- Blaumeise** — *Parus caeruleus*
 E 16.084* ○ nj. 7. 5.61 Aarwangen/BE (Haller)
 × 0. 4.68 Bützberg/BE ca. 6. 11. 0
 Die bisher älteste Blaumeise trug ihren Ring während 6 Jahren, 4 Monaten und
 20 Tagen (GLUTZ 1964).
- Kohlmeise** — *Parus major*
 419.426* ○ ♂ 22. 2.58 Lyss/BE (Ris)
 × 21.10.67 Lyss/BE (Niggeler) ?
 Der Ringfund lässt sich nicht auswerten, da das Skelett frühestens 1 Jahr nach
 dem Tod des Vogels gefunden wurde (E. NIGGELER briefl.). Daten der ältesten
 Ringvögel bei GLUTZ (1964).
- Rohrhammer** — *Emberiza schoeniclus*
 517.326 ○ nj. 23. 5.60 Yverdon/VD (Magnenat)
 c 20. 8.67 Chavornay/VD (Vuagniaux) 7. 2. 28
 387.969 ○ ♂ ad. 9. 4.60 Hagneck/BE (Marbot)
 c 24. 9.66 Hagneck/BE (Marbot) 6. 5. 15
- Buchfink** — *Fringilla coelebs*
 396.633 ○ ♂ ad. 8. 8.57 Bolligen/BE (Siegenthaler)
 × 18. 8.67 Bolligen/BE 10. 0. 10
 438.019* ○ ♀ 20.12.58 Killwangen/AG (Kühn)
 × 11.11.68 Würenlos/AG (Mattenberger) 9. 10. 22
 Daten des bisher ältesten Ringvogels bei GLUTZ (1964).
- Bergfink** — *Fringilla montifringilla* 146 Wiederfunde
 415.889 ○ ♂ ad. 22.10.57 Col de Bretolet/VS (Godel)
 × 9.10.64 Saint-Victor-Malescour: 45.17N/4.19E (Haute-Loire) France 6. 11. 17
 E 43.521* ○ ♂ dj. 12.10.61 Col de Bretolet/VS (Vogelwarde)
 × Winter 66/67 Mont Ventoux: 44.10N/5.17E (Vaucluse) France ?
 Siehe auch GLUTZ (1964).
- Distelfink** — *Carduelis carduelis* 165 Wiederfunde
 E 228.531* ○ ♂ ad. 12.10.65 Aarberg/BE (Siegenthaler)
 × 0.10.68 Saint-Pantaléon-les-Vignes: 44.24N/5.02E
 (Drôme) France ca. 3. 0. 0
 Daten der bisher ältesten Ringvögel bei GLUTZ (1964).
- Kernbeisser** — *Coccothraustes coccothraustes* 90 Wiederfunde
 679.614* ○ ♂ dj. 4. 9.59 Oensingen/SO (Hug)
 + 1.12.67 Draguignan: 43.32N/6.28E (Var) France 8. 2. 27
 Der bisher älteste Ringvogel trug seinen Ring während 7 Jahren, 11 Monaten
 und 22 Tagen (GLUTZ 1964).

- Haussperling** — *Passer domesticus* 493 Wiederfunde
 E 526.831 ○ ♂ 7. 2.61 Missy/VD (Blanc)
 c 6. 5.67 Missy/VD (Blanc) 6. 2. 29
 Der älteste Ringvogel trug seinen Ring während 8 Jahren und 7 Tagen (GLUTZ 1967).
- Feldsperling** — *Passer montanus* 231 Wiederfunde
 E 83.476 ○ 26.12.62 Sempach/LU (Vogelwarte)
 E 328.852 () 30. 7.68 Sempach/LU (Vogelwarte) 5. 7. 4
 Der älteste Ringvogel wurde mindestens 9-jährig (GLUTZ 1965).
- Pirol** — *Oriolus oriolus* 7 Wiederfunde
 690.734 ○ nj. 19. 6.60 Meienried/BE (Jenni)
 × 14. 5.67 zw. Lyss und Aarberg/BE 6. 10. 25
 717.618* ○ ♂ ad. 31. 5.62 Uesslingen/TG (Frei)
 + 8. 9.67 Terni: 42.34N/12.39E (Terni) Italien 5. 3. 8
- Tannenhäher** — *Nucifraga caryocatactes* 12 Wiederfunde
 932.574 ○ 10.10.59 Prés de Macolin Derrière, Lamboing/BE (Marbot)
 c 23. 6.67 Orvin/BE (Siegenthaler) 7. 8. 13
 Der älteste Tannenhäher trug seinen Ring während 8 Jahren und 18 Tagen (GLUTZ 1964).
- Alpendohle** — *Pyrhocorax graculus* 139 Wiederfunde
 936.823 ○ 27. 6.58 «Niesen» ob Reichenbach/BE (Jüsy)
 c 5. 3.67 «Männlichen» ob Wengen/BE (Schommer) 8. 8. 6
 Der älteste Ringvogel trug seinen Ring während 11 Jahren und 11 Tagen (GLUTZ 1965).
- Dohle** — *Corvus monedula* 190 Wiederfunde
 932.722* ○ dj. 25. 6.59 Sempach/LU (Vogelwarte)
 × 3. 7.67 Littau/LU 8. 0. 8
 Die älteste Dohle trug ihren Ring während 9 Jahren, 8 Monaten und 1 Tag (GLUTZ 1967).
- Rabenkrähe** — *Corvus corone* 200 Wiederfunde
 Z 202* ○ nj. 12. 5.60 Sempach/LU (Fuchs)
 × 25. 6.68 Hochdorf/LU 8. 1. 13
 Der älteste Ringvogel trug seinen Ring während 9 Jahren, 5 Monaten und 29 Tagen (GLUTZ 1967).
- Kolkrahe** — *Corvus corax* 22 Wiederfunde
 815.886* ○ nj. 23. 4.61 Bressonnaz, Moudon/VD (Blanc)
 × 21. 8.67 Guggisberg/BE ?
 820.741* ○ nj. 19. 4.64 Rovray/VD (Blanc)
 + 25.11.67 Le Saulgy/FR 3. 7. 6
 Ring Nr. 815.886 wurde mit Knochenresten in der Nähe eines Fuchsbaues im Wald gefunden. Vgl. auch GLUTZ (1967).

KURZE MITTEILUNGEN

Nasse Asphaltflächen als „Fallen“ für ziehende Haubentaucher. — Der Vogelwarte Sempach werden jedes Jahr, besonders im Spätherbst, einzelne Haubentaucher *Podiceps cristatus* eingeliefert, die auf oder neben asphaltierten Strassen, Plätzen oder Flugpisten gefunden wurden. Allen diesen Funden ist gemeinsam, dass sie bei Wetter erfolgen, bei dem diese Flächen nass sind und ein schwarzglänzendes, spiegelndes Aussehen haben und bei welchem auch die Sicht schlecht ist, also bei Nebel, Regen oder Naßschneefall. Auch auf vereisten Strassen in sonst schneebedeckter Landschaft sind Haubentaucher gelandet, und einer landete sogar